

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : dimanche 5 juillet 2020  
sur le site : COURADUQUE (col de)

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Amanita excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertillon		Amanite élevée
<i>Amanita excelsa</i> var. <i>spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat, 2004		Amanite épaisse
<i>Amanita jonquillea</i>	Quél., 1877		Amanite jonquille
<i>Amanita muscaria</i> f. <i>flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Poumarat, 20		Amanite tue-mouche à voile jaunâtre
<i>Amanita porphyria</i>	Alb. & Schwein. : Fr.		Amanite porphyre
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.		Golmotte, amanite vineuse
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. : Fr.) Redhead, Lutzoni, M		Clitocybe à pied en massue
<i>Amylostereum chailletii</i>	(Pers. : Fr.) Boidin		
<i>Arcyria obvelata</i>	(Oeder) Onsberg, 1979		
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.		Bolet à beau pied
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782		Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.		Pied rouge
<i>Botryohyphodermis isabellinus</i>	(Fr.) Donk		
<i>Botryosphaeria abietina</i>	(Prill. & Delacr.) Maubl.		
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.		Calocère visqueuse
<i>Calvatia utriformis</i>	(Bull. : Pers.) Jaap		Calvatie en outre
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	(O.F.Müll.) T.Macbr., 1899		Fruticuleuse commune
<i>Chalciporus piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille		Bolet poivré
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ramamurt		Pezize turquoise
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889		Clavaire à crêtes
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.		Meunier
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.		Collybie beurrée
<i>Coltricia perennis</i>	(L. : Fr.) Gray		Coltricie
<i>Coniophora olivacea</i>	(Fr. : Fr.) P.Karst.		
<i>Cortinarius cinnamomeoluteus</i>	P.D. Orton, 1960		Cortinaire jaune cannelle
<i>Cortinarius glaucopus</i>	(Schaeffer : Fr.) Fr., non ss Bres		Cortinaire à pied glauque
<i>Cortinarius stillatitius</i>	Fr., 1838		Cortinaire dégoutant
<i>Cortinarius vibratilis</i>	(Fr. : Fr.) Fr.		Cortinaire amarissime
<i>Crepidotus applanatus</i>	(Pers.) Kumm.		Crépidote aplani
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.		Dacrymycète déliquescent
<i>Ditiola pezizaeformis</i>	(Lév.) D.A. Reid		Ditiole en forme de pezize
<i>Exobasidium rhododendri</i>	(Fuckel) Cramer	Rhododendron	Exobasidium du rhododendron
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.		Amadouvier des conifères
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780		Fleur de tan
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	Abies alba	Galère marginée
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	(Wulfen : Fr.) P.Karst.	Abies alba	Lenzite des clôtures
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	Abies alba	Flammule pénétrante
<i>Helminthosphaeria clavariarum</i>	(L.R.Tulasne) Fuckel	Clavulina cristata	Parasite de clavaire
<i>Hydnum repandum</i> f. <i>rufescens</i>	.....		Pied de mouton roussâtre
<i>Hypholoma epixanthum</i> var. <i>radicosum</i>	(J.E. Lange) Bon & Roux		Hypholome radicant
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 1871	Abies alba	Hypholome en touffe
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Tul. & C.Tul., 1860	Sur bolet sp	
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983		Laccaire à lames pâles
<i>Lachnellula gallica</i>	(P.Karst. & Har.) Dennis	Abies alba	

**Liste des taxons répertoriés le : dimanche 5 juillet 2020  
sur le site : COURADUQUE (col de)**

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Lactarius deterrimus</i>	Gröger, 1968	Picea abies	Lactaire de l'épicéa
<i>Lichenomphalina umbellifera</i>	(Linnaeus) Redhead, Lutzoni, M	Abies alba	Omphale lichénisée
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829		Lait de loup
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Pers. : Pers.		Vesse de loup brun d'ombre
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	Fagus sylvatica	Marasme à odeur d'ail
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar		Collybie à larges lames
<i>Mutinus caninus</i>	(Huds. : Pers.) Fr.		Satyre du chien
<i>Mycena epipterygia</i>	(Scop. : Fr.) Gray		Mycène des fougères
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray		Mycène en casque
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg		Mycène rose
<i>Panaeolus sphinctrinus</i>	(Fr.) Quél., 1872		Panéole à marge dentée
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.		Paxille enroulé
<i>Peziza badia</i>	Pers. : Fr.		Pézize baie
<i>Phaeocollybia jennyae</i>	(Karsten) Heim, sensu Horak		
<i>Phaeocollybia lugubris</i>	(Fr. : Fr.) Heim		Phaeocollybie lugubre
<i>Phellinus hartigii</i>	(Allesch. & Schnabl) Pat.	Abies alba	Amadouvier du sapin
<i>Phlebiella vaga</i>	(Fr. : Fr.) P.Karst.	Abies alba	
<i>Physarum album</i>	(Bull.) Chevall., 1826		Physare tremblant
<i>Physarum viride</i>	(Bull.) Pers., 1795		
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.		Plutée couleur de cerf
<i>Postia caesia</i>	(Schrad. : Fr.) P.Karst.	Abies alba	Polypore bleuté
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982		Polypore blanc cendré
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	Fagus sylvatica	Polypore cinabre
<i>Ramaria abietina</i>	(Pers. : Fr.) Quél.		
<i>Ramaria suecica</i>	(Fr. : Fr.) Donk		
<i>Ripartites tricholoma</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) P.Karst.		Ripartite poilu
<i>Russula amethystina</i>	Quél., 1898		Russule améthyste
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.		Russule charbonnière
<i>Russula nauseosa</i>	(Pers.) Fr., 1838		Russule nauséuse
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	Fagus sylvatica	Stérée hirsute
<i>Stereum sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr.	Abies alba	Stérée sanguinolente
<i>Stropharia semiglobata</i>	(Batsch : Fr.) Quél., 1872		Strophaire demi sphérique
<i>Trechispora hymenocystis</i>	(Berk. & Broome) K.-H. Larsson	Abies alba	
<i>Trichia varia</i>	(Pers. ex J.F.Gmel.) Pers., 1794		
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Bon, 1983		Tricholome qui fait cligner des ye
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilber		Bolet bai
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888		Bolet à chair jaune

Nombre d'espèces : **81**