

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : dimanche 19 juillet 202

sur le site : OUBAC

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Agaricus silvicola</i>	(Vittad.) Peck, 1870		Agaric anisé des bois
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat, 2004		Amanite épaisse
<i>Amanita fulva</i>	(Schaeff. ?) Fr.		Amanite fauve
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877		Amanite jonquille
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.		Golmotte, amanite vineuse
<i>Amanita rubescens f. annulosulfurea</i>	(Gillet) E.-J. Gilbert		Golmotte à anneau jaune
<i>Amylostereum chailletii</i>	(Pers. : Fr.) Boidin		
<i>Annulohyphoxylon multiforme</i>	(Fr. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.Rogers &	Fagus sylvatica	Hypoxylon multiforme
<i>Biscogniauxia nummularia</i>	(Bull. : Fr.) Kuntze		Hypoxylon en forme de pièce de
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E.Carp.		Bisporelle citrine
<i>Bjerkandera adusta</i>	(Willd. : Fr.) P.Karst., 1879		Polypore brûlé
<i>Boletus aestivalis</i>	(Paulet) Fr., 1838		Cèpe d'été, Cèpe réticulé
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.		Bolet à beau pied
<i>Boletus calopus f. ereticulatus</i>	Estades & Lannoy		Bolet à beau pied sans réseau
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782		Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus edulis f. nigricans</i>	Lannoy & Estades ad int.		Cèpe de Bordeaux forme noirâtre
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.		Pied rouge
<i>Boletus luridus</i>	Schaeff. : Fr.		Bolet blafard
<i>Boletus subappendiculatus</i>	Dermek, Lazebnicek & Veselský		Bolet des sapins
<i>Bulgariella pulla</i>	(Fr.) P.Karst.	Fagus sylvatica	
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.		Calocère visqueuse
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887		Girolle améthyste
<i>Cantharellus friesii</i>	Quél., 1872		Chanterelle abricot
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	(O.F.Müll.) T.Macbr., 1899		Fruticuleuse commune
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ramamurt		Pezize turquoise
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889		Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.		Clitocybe en entonnoir
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.		Collybie aqueuse
<i>Collybia peronata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.		Marasme poivré
<i>Corticium roseum</i>	Pers. : Fr.		
<i>Cortinarius camphoratus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.		Cortinaire à corne brûlée
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	(L. : Fr.) Gray		Cortinaire à lames cannelle
<i>Cortinarius subtortus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.		
<i>Diatrype decorticata</i>	(Pers. : Fr.) Rappaz		
<i>Entoloma rhodopolium f. nidorosum</i>	(Fr.) Noordeloos		Entolome à odeur de nitre
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.		Amadouvier
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.		Amadouvier des conifères
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780		Fleur de tan
<i>Fuscoporia ferruginosa</i>	(Schrad. : Fr.) Murrill	Fagus sylvatica	Phellin ferrugineux
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935		Galère marginée
<i>Ganoderma australe</i>	(Fr. : Fr.) Pat., 1889		Ganoderme européen
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908		Ganoderme aplani
<i>Hapalopilus rutilans</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.		Polypore rutilant
<i>Helvella elastica</i>	Bull. : Fr.		Helvelle élastique

Liste des taxons répertoriés le : dimanche 19 juillet 202
sur le site : OUBAC

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Heterobasidion abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 1998		Hétérobaside du sapin
<i>Hydnum repandum f. rufescens</i>		Pied de mouton roussâtre
<i>Hygrophorus eburneus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.		Hygrophore blanc d'ivoire
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 1871		Hypholome en touffe
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx		Hypoxylon en forme de fraise
<i>Inocybe hystrix</i>	(Fr.) P.Karst.		Inocybe hérissé
<i>Irpex fimbriatus</i>	(Pers. : Fr.) Kotiranta & Saaren	Fagus sylvatica	Steccherine fimbriée
<i>Irpex nitidus</i>	(Pers. : Fr.) Saarenoksa & Kotir		Polypore lustré
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer & A.H.Sm.		Pholiote changeante
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983		Laccaire à lames pâles
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke		Améthyste, petit violet
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair		Lactaire saumoné
<i>Lactarius subdulcis</i>	(Pers. : Fr.) Gray		Lactaire presque doux
<i>Lactarius volemus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.		Lactaire à lait abondant
<i>Laxitextum bicolor</i>	(Pers. : Fr.) Lentz, 1956		Stérée bicolore
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.		Lenzite du bouleau
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829		Lait de loup
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.		Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Cooke & Quél.		Marasme à pied corné
<i>Marasmius rotula</i>	(Scop. : Fr.) Fr.		Marasme petite roue
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar		Collybie à larges lames
<i>Mycena crocata</i>	(Schrad. : Fr.) Kumm.		Mycène à lait orangé
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.		Mycène livide
<i>Mycena renatii</i>	Quél.		Mycène à pied jaune
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg		Mycène rose
<i>Mycena rubromarginata</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.		Mycène à marge rouge
<i>Orbilia delicatula</i>	(P.Karst.) P.Karst., non (Fuckel)	Fagus sylvatica	Orbilie délicate
<i>Otidea onotica</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel		Oreille de lièvre
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.		Mucidule visqueuse
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.		Paxille enroulé
<i>Peniophora cinerea</i>	(Pers. : Fr.) Cooke, 1879	Fagus sylvatica	Peniophore cendrée
<i>Peziza arvernensis</i>	Boud.		
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.		Phalle impudique
<i>Phellinus hartigii</i>	(Allesch. & Schnabl) Pat.	Abies alba	Amadouvier du sapin
<i>Phlebiella vaga</i>	(Fr. : Fr.) P.Karst.	Fagus sylvatica	
<i>Pholiota astragalina</i>	(Fr. : Fr.) Singer		Pholiote astragale
<i>Pleurotus ostreatus</i>	(Jacq.) Kumm., 1871		Pleurote en huitre
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.		Plutée couleur de cerf
<i>Pluteus leoninus</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm., 1871		Plutée couleur de lion
<i>Pluteus luteovirens</i>	Rea, 1927		Plutée jaune verdâtre
<i>Polyporus ciliatus</i>	Fr. : Fr.		Polypore cilié
<i>Polyporus leptocephalus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr., 1821		Polypore variable
<i>Postia subcaesia</i>	(A. David) Jülich, 1982		Polypore bleuté
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982		Polypore blanc cendré
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 1868		Hydne gélatineux
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.		Polypore cinabre
<i>Russula amethystina</i>	Quél., 1898		Russule améthyste
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.		Russule charbonnière

Liste des taxons répertoriés le : dimanche 19 juillet 202
sur le site : OUBAC

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Russula fageticola</i>	Melzer ex S.Lundell, 1956		Russule du hêtre
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.		Russule ocre et blanc
<i>Russula solaris</i>	Ferdinansen & Winge		Russule solaire
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815		Schizophylle commune
<i>Scutellinia crinita</i>	(Bull. : Fr.) Lambotte		
<i>Skeletocutis nivea</i>	(Jungh.) Keller, 1979		Tramète blanc de neige
<i>Stereum rugosum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.		Stérée rugueuse
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	Fagus sylvatica	Tramète hirsute
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	Corylus avellana	Tramète versicolore
<i>Tremella candida</i>	Pers., 1801	Peniophora cinerea	.
<i>Tricholoma pseudonicitans</i>	Bon, 1983		Tricholome qui fait cligner des ye
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer		Tricholome rutilant
<i>Tubifera ferruginosa</i>	(Batsch) J.F.Gmel., 1792		Tubifère ferrugineux
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Qué., 1888		Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus subtomentosus</i>	(L. : Fr.) Qué.		Bolet subtomenteux
<i>Xerula radicata f. marginata</i>	(Konrad & Maubl.) R.H. Peterse		Collybie radicante à arêtes brun
<i>Xylaria polymorpha</i>	(Pers.) Grev., 1824		Xylaire polymorphe

Nombre d'espèces :	109
--------------------	------------