

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 23/08/2020

sur le site : BEYREDE (Col de)

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Amanita excelsa</i> var. <i>spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat, 2004	.	Amanite épaisse
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. : Fr.) Redhead, Lutzoni, M	.	Clitocybe à pied en massue
<i>Amylostereum chailletii</i>	(Pers. : Fr.) Boidin	.	
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	.	Bolet à beau pied
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	.	Pied rouge
<i>Boletus subappendiculatus</i>	Dermek, Lazebnicek & Veselský	.	Bolet des sapins
<i>Bondarzewia mesenterica</i>	(Schaeff.) Kreisel	.	Polypore des montagnes
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	.	Calocère visqueuse
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	.	Meunier
<i>Cortinarius camphoratus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	.	Cortinaire à corne brûlée
<i>Cortinarius croceus</i>	(Schaeff. : Fr.) Gray	.	Cortinaire jaune
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.	.	Dacrymycète déliquescent
<i>Ditiola pezizaeformis</i>	(Lév.) D.A. Reid	Abies alba	Ditiole en forme de pezize
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	.	Amadouvier des conifères
<i>Fuligo cinerea</i>	(Schwein.) Morgan, 1896	.	Fuligo gris cendré
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	.	Fleur de tan
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	.	Ganoderme luisant charnu
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	.	Ganoderme aplani
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	(Wulfen : Fr.) P.Karst.	.	Lenzite des clôtures
<i>Heterobasidium abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 1998	.	Hétérobaside du sapin
<i>Hydnum repandum</i> f. <i>rufescens</i>	Pied de mouton roussâtre
<i>Hydropus marginellus</i>	(Pers. : Fr.) Singer	.	Hydrope marginé
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	(Bulliard : Fr.) L.R. et C.Tulasne	.	Dermatose des bolets
<i>Irpex bourdotii</i>	(Saliba & A. David) Kotiranta &	.	
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	.	Laccaire à lames pâles
<i>Laccaria bicolor</i>	(Maire) P.D. Orton	.	Laccaire bicolore
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	(Bull. : Fr.) Pat.	.	Lacrimaire velouté
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	.	Lactaire saumoné
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	.	Coulemelle sombre
<i>Marasmiellus perforans</i>	(Hoffm. : Fr.) Antonin, Halling	.	Marasme perforant
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	.	Faux mousseron
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	.	Collybie à larges lames
<i>Panaeolus sphinctrinus</i>	(Fr.) Quél., 1872	.	Panéole à marge dentée
<i>Peniophora piceae</i>	(Pers.) J. Erikss.	Abies alba	Peniophore du sapin
<i>Phellinus hartigii</i>	(Allesch. & Schnabl) Pat.	.	Amadouvier du sapin
<i>Pholiota adiposa</i>	(Batsch : Fr.) Kumm.	.	Pholiote adipeuse
<i>Pholiota astragalina</i>	(Fr. : Fr.) Singer	.	Pholiote astragale
<i>Pholiota flammans</i>	(Batsch : Fr.) Kumm.	.	Pholiote incandescente
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 1868	.	Hydne gélatineux
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	.	Polypore cinabre
<i>Rickenella fibula</i>	(Bull. : Fr.) Raithehl., 1973	.	Omphale bibelot
<i>Russula albonigra</i>	(Krombh.) Fr.	.	Russule blanche et noire
<i>Russula amethystina</i>	Quél., 1898	.	Russule améthyste

Liste des taxons répertoriés le : 23/08/2020
sur le site : BEYREDE (Col de)

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Russula anthracina</i>	Romagn., 1962	.	Russule anthracite
<i>Russula badia</i>	Quél., 1881	.	Russule baie
<i>Russula integra f. purpurella</i>	(Singer) Romagn. ex Bon, 1986	.	Russuleintègre pourpre
<i>Russula laricina</i>	Velen.	.	Russule des mélèzes
<i>Russula mustelina</i>	Fr., 1838	.	Russule belette
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	.	Russule noircissante
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	.	Russule ocre et blanc
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	.	Russule olivacée
<i>Russula phlyctidospora</i>	(Romagnesi) Bon inval.	.	Russule à spores verruqueuses
<i>Russula queletii</i>	Fr., 1872	.	Russule de Quelet
<i>Russula subfoetens</i>	W.G. Smith	.	Russule presque fétide
<i>Russula vesca</i>	Fr., 1836	.	Russule comestible
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	.	Schizophylle commune
<i>Setulipes androsaceus</i>	(L. : Fr.) Antonín	.	Marasme androsace
<i>Sidera vulgaris</i>	(Fr. : Fr.) Miettinen, 2011	.	
<i>Stropharia semiglobata</i>	(Batsch : Fr.) Quél., 1872	.	Strophaire demi sphérique
<i>Trichia favoginea</i>	(Batsch) Pers., 1794	.	
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	.	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholoma saponaceum var. squamosum</i>	(Cooke) Rea, 1922	.	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholomopsis decora</i>	(Fr. : Fr.) Singer	.	Tricholome décoré
<i>Vascellum pratense</i>	(Pers. : Pers.) Kreisel	.	Vesse de loup à diaphragme
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilber	.	Bolet bai
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	.	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	(Schaeff.) Bon	.	Bolet ferrugineux
<i>Xerocomus pruinatus</i>	(Fr.) Quél.	.	Bolet pruineux

Nombre de taxons : **69**