

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 30/08/2020

sur le site : MONT DE GEZ

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Agaricus essettei</i>	Bon ex Bon	.	Agaric à pied bulbeux
<i>Amanita excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertillon	.	Amanite élevée
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877	.	Amanite jonquille
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	.	Golmote, amanite vineuse
<i>Annulohyphoxylon cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.Rogers	Fagus sylvatica	
<i>Ascodichaena rugosa</i>	Butin, 1977	Fagus sylvatica	
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E.Carp.	Fagus sylvatica	Bisporelle citrine
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	.	Bolet à beau pied
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	.	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	.	Pied rouge
<i>Boletus erythropus var. discolor</i>	(Quélet) Dermek, Kuthan et Sing	.	Pied rouge décoloré
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	.	Calocère visqueuse
<i>Cantharellus ferruginascens</i>	P.D. Orton, 1969	.	Chanterelle ferrugineuse
<i>Cantharellus subpruinus</i>	Eyssartier & Buyck	.	Girolle presque pruineuse
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ramamurt	.	Pezize turquoise
<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuyper, 1981	.	Clitocybe à odeur de poulailler
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	.	Collybie aqueuse
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	.	Collybie en touffes
<i>Collybia peronata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	.	Marasme poivré
<i>Cortinarius camphoratus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	.	Cortinaire à corne brûlée
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	Salix sp	Tramète rougissante
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer	Corylus avellana	Tramète rougissante
<i>Dasyscyphella nivea</i>	(Hedw. ex Fr.) Raitv.	.	
<i>Datronia mollis</i>	(Sommerf. : Fr.) Donk	.	Datronie molle
<i>Diatrype decorticata</i>	(Pers. : Fr.) Rappaz	Fagus sylvatica	
<i>Encoelia fimbriata</i>	Spooner & Trigaux, 1985	Corylus avellana	
<i>Fistulina hepatica</i>	(Schaeff. : Fr.) Withering	.	Langue de bœuf
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	Abies alba	Amadouvier des conifères
<i>Fuligo cinerea</i>	(Schwein.) Morgan, 1896	.	Fuligo gris cendré
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	.	Fleur de tan
<i>Heterobasidium annosum</i>	(Fr. : Fr.) Brefeld	Picea abies	Polypore du rond des pins
<i>Hymenochaete corrugata</i>	(Fr. : Fr.) Lév.	.	Hyménochaète du noisetier
<i>Hypocreopsis rhododendri</i>	Thaxt.	.	Hypocrée faux lichen
<i>Hypomyces rosellus</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Tul. & C.	Piptoporus betulinus	
<i>Hypoxylon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	.	
<i>Irpex nitidus</i>	(Pers. : Fr.) Saarenoksa & Kotir	.	Polypore lustré
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer & A.H.Sm.	.	Pholiotte changeante
<i>Lactarius volemus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	Picea abies	Lactaire à lait abondant
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	.	Lenzite du bouleau
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Bousset & Jossierand ex Bousset	.	Lépiote à base rouge
<i>Lepiota ventriospora</i>	D.A. Reid, 1958	.	Lépiote à spores ventruées
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Singer	.	Cortinaire blanc bulbeux
<i>Marasmius rotula</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	.	Marasme petite roue
<i>Marasmius scorodoni</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	.	Marasme à odeur de poireau

**Liste des taxons répertoriés le : 30/08/2020**  
**sur le site : MONT DE GEZ**

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	.	Collybie à larges lames
<i>Mycena renatii</i>	Quél.	.	Mycène à pied jaune
<i>Panellus stipticus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	.	Panelle styptique
<i>Phaeocollybia lugubris</i>	(Fr. : Fr.) Heim	.	Phaeocollybie lugubre
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	.	Phalle impudique
<i>Phellodon niger</i>	(Fr. : Fr.) P.Karst.	Picea abies	Hydne noir
<i>Phlebiella vaga</i>	(Fr. : Fr.) P.Karst.	Picea abies	
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	Betula sp	Polypore du bouleau
<i>Plicaturopsis crispa</i>	(Pers. : Fr.) D.A. Reid	Betula sp	Plicature du hêtre
<i>Pluteus leoninus</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm., 1871	.	Plutée couleur de lion
<i>Pluteus nanus</i>	(Pers. : Fr.) Kummer, ss Fr.	.	Plutée nain
<i>Polyporus leptcephalus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr., 1821	.	Polypore variable
<i>Porostereum spadiceum</i>	(Pers. : Fr.) Hjortstam & Ryvard	Fagus sylvatica	Lophaire châtaigne
<i>Postia subcaesia</i>	(A. David) Jülich, 1982	.	Polypore bleuté
<i>Ramaria gracilis</i>	(Pers. : Fr.) Quél.	.	Ramaire à odeur d'anis
<i>Ramaria subbotrytis</i>	(Coker) Corner, 1950	.	Clavaire rouge corail
<i>Ramaria suecica</i>	(Fr. : Fr.) Donk	.	
<i>Rickenella fibula</i>	(Bull. : Fr.) Raitheh., 1973	.	Omphale bibelot
<i>Russula anthracina var. carneifolia</i>	Romagn., 1962	.	Russule anthracite à lames rosées
<i>Russula atroglauca</i>	Einhellinger	Betula sp	
<i>Russula aurea</i>	Pers., 1796	.	Russule dorée
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	.	Russule charbonnière
<i>Russula fellea</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	.	Russule de fiel
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	.	Russule ocre et blanc
<i>Russula risigallina</i>	(Batsch) Sacc., 1915	.	Russule caméléon
<i>Russula subfoetens</i>	W.G. Smith	.	Russule presque fétide
<i>Russula vesca</i>	Fr., 1836	.	Russule comestible
<i>Russula violeipes</i>	Quél., 1898	.	Russule à pied violet
<i>Russula violeipes f. citrina</i>	(Quél.) Romagn.	.	Russule à pied violet forme jaune
<i>Russula virescens</i>	(Schaeff.) Fr.	.	Verdette Russule verdoyante
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	.	Scléroderme vulgaire
<i>Setulipes androsaceus</i>	(L. : Fr.) Antonín	.	Marasme androsace
<i>Skelotocutis nemoralis</i>	A. Korhonen et Miettinen	.	
<i>Spathularia flavida</i>	Pers. : Fr.	.	Spatulaire jaune
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	Fagus sylvatica	Stérée hirsute
<i>Stereum insignitum</i>	Quél., 1889	Fagus sylvatica	Stérée remarquable
<i>Stereum ochraceoflavum</i>	(Schwein.) J.B. Ellis	.	Stérée ocre pâle
<i>Stereum rugosum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	Corylus avellana	Stérée rugueuse
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	Corylus avellana	Tramète versicolore
<i>Tylopilus felleus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	.	Bolet de fiel
<i>Tyromyces kmetii</i>	(Bres.) Bondarzew & Singer	.	
<i>Xerocomus armeniacus</i>	(Quél.) Quél., 1888	.	Bolet abricot
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilber	.	Bolet bai
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	.	Collybie radicante

Nombre de taxons : **88**