

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 04/10/2020  
sur le site : PAYOLLE

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Agaricus essettei</i>	Bon ex Bon	.	Agaric à pied bulbeux
<i>Agaricus semotus</i>	Fr., 1863	.	Agaric solitaire
<i>Amanita muscaria f. flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Poumarat, 20	.	Amanite tue-mouche à voile jaunâ
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Armillaria ostoyae</i>	(Romagn.) Herink, 1973	.	Armillaire d'Ostoya
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	.	Bolet à beau pied
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	.	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	.	Pied rouge
<i>Bondarzewia mesenterica</i>	(Schaeff.) Kreisel	.	Polypore des montagnes
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	.	Calocère visqueuse
<i>Calvatia excipuliformis</i>	(Scop. : Pers.) Perdeck	.	Calvatie en coupe
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	.	Girolle améthyste
<i>Chalciporus piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille	.	Bolet poivré
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	.	Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe dealbata</i>	(Sowerby : Fr.) Kumm.	.	Clitocybe blanchi
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	.	Clitocybe en entonnoir
<i>Clitocybula lacerata</i>	(Scop.) Métrod ex Singer	.	Collybie lacérée
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	.	Meunier
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	.	Collybie aqueuse
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	.	Collybie beurrée
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Fr., 1838	.	Cortinaire purpurescent
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	.	Chanterelle en tube
<i>Cystoderma amianthinum</i>	(Scop.) Fayod, 1889	.	Cystoderme amiantacé
<i>Cystoderma amianthinum f. rugosoreticul</i>	(Lorinser) A.H.Sm. & Singer	.	Cystoderme rugueux
<i>Cystoderma amianthinum var. album</i>	(Maire) Locquin	.	Cystoderme amiantacé forme Bla
<i>Entoloma lividoalbum</i>	(Kühner & Romagn.) Kubička	.	Entolome blanc et bleu
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	.	Amadouvier des conifères
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	.	Galère marginée
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	.	Ganoderme luisant charnu
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	.	Ganoderme aplani
<i>Geastrum rufescens</i>	Pers. : Pers.	.	Géastre roux
<i>Gymnopilus junonius</i>	(Fr. : Fr.) P.D. Orton	.	Pholiote remarquable
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	.	Flammule pénétrante
<i>Hebeloma radicosum</i>	(Bull. : Fr.) Ricken	.	Hébélome radican
<i>Helminthosphaeria clavariarum</i>	(L.R.Tulasne) Fuckel	.	Parasite de clavaire
<i>Hydnum repandum f. rufescens</i>	.....	.	Pied de mouton roussâtre
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	.	Fausse girolle
<i>Hygrophorus eburneus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	.	Hygrophore blanc d'ivoire
<i>Hypholoma capnoides</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	.	Hypholome doux
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 1871	.	Hypholome en touffe
<i>Hypomyces lateritius</i>	(Fr. : Fr.) Tul. & C.Tul., 1860	lactarius salmonicolor	
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	.	Laccaire à lames pâles
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	.	Améthyste, petit violet
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	.	Lactaire muqueux

# Liste des taxons répertoriés le : 04/10/2020

sur le site : PAYOLLE

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Lactarius deterrimus</i>	Gröger, 1968	.	Lactaire de l'épicéa
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	.	Lactaire saumoné
<i>Lactarius subdulcis</i>	(Pers. : Fr.) Gray	.	Lactaire presque doux
<i>Lactarius trivialis</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	.	Lactaire trivial
<i>Lactarius vellereus var. hometii</i>	(Gillet) Boud.	.	Lactaire velouté
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	.	Lenzite du bouleau
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	.	Clitocybe nébuleux
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Singer	.	Cortinaire blanc bulbeux
<i>Leucopaxillus amarus</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Kühner	Abies alba	Leucopaxille amer
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	.	Lait de loup
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	.	Vesse de loup perlée
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Pers. : Pers.	.	Vesse de loup brun d'ombre
<i>Macrocystidia cucumis</i>	(Pers. : Fr.) Joss., 1933	.	Collybie à odeur de concombre
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	.	Coulemelle sombre
<i>Melanoleuca brevipes</i>	(Bulliard) Patouillard, ss Konra	.	Melanoleuca à pied court
<i>Mycena pseudocorticola</i>	Kühner, 1938	.	Mycène presque corticole
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	.	Mycène pure
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	.	Mycène rose
<i>Mycena zephrus</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	.	Mycène taché
<i>Ombrophila pura</i>	(Pers. : Fr.) Baral	.	Bulgarie pure
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	.	Mucidule visqueuse
<i>Pholiota adiposa</i>	(Batsch : Fr.) Kumm.	.	Pholiote grasse
<i>Pholiota astragalina</i>	(Fr. : Fr.) Singer	.	Pholiote astragale
<i>Pholiota lenta</i>	(Pers. : Fr.) Singer	.	Pholiote glutineuse
<i>Pluteus tricuspidatus</i>	Velen.	Abies alba	Plutée à lame bordée de noir
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	(Bull. : Fr.) Singer	.	Clitocybe en vase
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 1868	.	Hydne gélatineux
<i>Russula mustelina</i>	Fr., 1838	.	Russule belette
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	.	Russule ocre et blanc
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	.	Russule olivacée
<i>Setulipes androsaceus</i>	(L. : Fr.) Antonín	.	Marasme androsace
<i>Sparassis brevipes</i>	Krombh.	.	Chou-fleur lamé
<i>Stereum sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr.	.	Stérée sanguinolente
<i>Stropharia semiglobata</i>	(Batsch : Fr.) Quél., 1872	.	Strophaire demi sphérique
<i>Tephrocybe rancida</i>	(Fr. : Fr.) Donk	.	Collybie à odeur rance
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	.	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	.	Tricholome rutilant
<i>Vascellum pratense</i>	(Pers. : Pers.) Kreisel	.	Vesse de loup à diaphragme
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J. Gilber	.	Bolet bai
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	(Schaeff.) Bon	.	Bolet ferrugineux
<i>Xerula melanotricha</i>	Dörfelt, 1979	.	Collybie à poils noirs

Nombre de participants : 13

Nombre de taxons répertoriés : 85