

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 25/10/2020

sur le site : BERGONS (forêt d ARRAGNAT)

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Agaricus silvicola</i>	(Vittad.) Peck, 1870	.	Agaric anisé des bois
<i>Amanita muscaria f. flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Poumarat, 20	.	Amanite tue-mouche à voile jaunâ
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Annulohyphoxylon cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.Rogers	.	
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	.	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	.	Calocère visqueuse
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ramamurt	.	Pezize turquoise
<i>Chrysomphalina grossula</i>	(Pers.) Norvell, Redhead & Amm	.	Hygrophore vert jaune
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	.	Clavaire à crêtes
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	.	Collybie beurrée
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quéf.	.	Chanterelle en tube
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.	.	Dacrymycète déliquescent
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	.	Tramète rougissante
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	.	Amadouvier des conifères
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	.	Galère marginée
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	.	Pied de mouton
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	.	Fausse girofle
<i>Hygrophorus agathosmus</i>	(Fr.) Fr., 1838	.	Hygrophore à odeur agréable
<i>Hygrophorus eburneus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	.	Hygrophore blanc d'ivoire
<i>Hypholoma capnoides</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	.	Hypholome doux
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 1871	.	Hypholome en touffe
<i>Hypoxydon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	.	Hypoxydon en forme de fraise
<i>Inocybe calamistrata</i>	(Fr. : Fr.) Gillet	.	Inocybe à base vert sombre
<i>Inocybe geophylla var. lilacina</i>	(Peck) Gillet, 1876	.	Inocybe terreux lilacin
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	.	Améthyste, petit violet
<i>Lactarius deterrimus</i>	Gröger, 1968	.	Lactaire de l'épicéa
<i>Leotia lubrica</i>	(Scop.) Pers. : Fr.	.	Léotie visqueuse
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	.	Clitocybe nébuleux
<i>Leptosporomyces roseus</i>	Jülich, 1972	.	
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	.	Coulemelle sombre
<i>Macrolepiota puellaris</i>	(Fr.) Moser	.	Lépiote délicate
<i>Morganella pyriformis</i>	(Schaeff. : Pers.) Kreisel & D.Kr	.	Vesse de loup en forme de poire
<i>Mycena crocata</i>	(Schrad. : Fr.) Kumm.	.	Mycène à lait orangé
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	.	Mycène pure
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	.	Mycène rose
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	.	Mucidule visqueuse
<i>Pleurocybella porrigens</i>	(Pers. : Fr.) Singer	.	Pleurote en oreille
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	.	Plutée couleur de cerf
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 1868	.	Hydne gélatineux
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	.	Polypore cinabre
<i>Rozites caperatus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	.	Pholiote ridée
<i>Stropharia aeruginosa</i>	(Curt. : Fr.) Quéf.	.	Strophaire vert de gris
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	.	Tramète hirsute
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	.	Tramète versicolore

Liste des taxons répertoriés le : 25/10/2020
sur le site : BERGONS (forêt d ARRAGNAT)

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	.	Tricholome rutilant
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	.	Bolet à chair jaune

Nombre de participants : 6

Nombre de taxons répertoriés : 46