

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 27/05/2021

sur le site : SEMEAC (Bois du château)

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Annulohypoxyton minutellum</i>	(Syd. & P. Syd.) Y.M.Ju, J.D.Rog	Quercus	
<i>Boletus queletii</i>	Schulzer	.	Bolet de Quélet
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	(O.F.Müll.) T.Macbr., 1899	.	Fruticuleuse commune
<i>Clathrus archeri</i>	(Berk.) Dring, 1980	.	Anthurus d'Archer
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew & Singer	Prunus avium	Tramète rougissante
<i>Daldinia childiae</i>	J.D. Rogers & Y.M. Ju, 1999	Fraxinus excelsior	Daldinie de Child
<i>Daldinia concentrica</i>	(Bolton : Fr.) Ces. & De Not.	.	Daldinie concentrique
<i>Eutypa maura</i>	(Fr. : Fr.) Fuckel	Acer sp	
<i>Favolaschia calocera</i>	R.Heim, 1945	Robinia pseudoacacia	Raquette orange
<i>Fuligo cinerea</i>	(Schwein.) Morgan, 1896	.	Fuligo gris cendré
<i>Fuscoporia ferruginosa</i>	(Schrad. : Fr.) Murrill	.	Phellin ferrugineux
<i>Hymenochaete corrugata</i>	(Fr. : Fr.) Lév.	Corylus avellana	Hyménochaète du noisetier
<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	(Dicks. : Fr.) Lév., 1846	Castanea sativa	Hyménochaète rouillé
<i>Hyphoderma radula</i>	(Fr. : Fr.) Donk	Prunus avium	
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 1871	.	Hypholome en touffe
<i>Hypomyces polyporinus</i>	Peck	.	
<i>Hypoxyton fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	Corylus avellana	
<i>Hypoxyton howeanum</i>	Peck, 1872	Quercus	
<i>Hypoxyton ticinense</i>	L.E. Petrini	Acer pseudoplatanus	
<i>Marasmius hudsonii</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	Ilex aquifolium	
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar	.	Collybie à larges lames
<i>Phellinus punctatus</i>	(P.Karst.) Pilát, 1942	Corylus avellana	Phellin ponctué
<i>Phlebia merismoides</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	Quercus	Phlébie orangée
<i>Phlebia rufa</i>	(Pers. : Fr.) M.P. Christiansen	Quercus	Phlébie rousse
<i>Phylloporia ribis</i>	(Schumach. : Fr.) Ryvarden	Robinia pseudoacacia	Phyllopore du groseillier
<i>Polyporus alveolaris</i>	(Bosc : Fr.) Fr.	.	Polypore du murier
<i>Pulcherricium caeruleum</i>	(Lamarck : Fr.) Parmasto	.	Croûte bleue
<i>Steccherinum ochraceum</i>	(Pers.) Gray, 1821	.	Hydne ocré
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	Quercus	Stérée hirsute
<i>Stereum ochraceoflavum</i>	(Schwein.) J.B. Ellis	.	Stérée ocre pâle
<i>Trichaptum bifforme</i>	(Fr.) Ryvarden, 1972	.	Polypore parchemin
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	.	Tricholome rutilant
<i>Tubaria conspersa</i>	(Pers. : Fr.) Fayod	.	Tubaire voilée

Nombre de participants : 14

Nombre de taxons répertoriés : 33