

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 28/08/2021

sur le site : MOURGOUEILH (bois de)

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Agaricus silvicola</i>	(Vittad.) Peck, 1870	-	.	Agaric anisé des bois
<i>Amanita excelsa</i>	(Fr. : Fr.) Bertillon	-	.	Amanite élevée
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat,	-	.	Amanite épaisse
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877	-	.	Amanite jonquille
<i>Amanita porphyria</i>	Alb. & Schwein. : Fr.	-	.	Amanite porphyre
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. : Fr.) Redhead, Lut	-	.	Clitocybe à pied en massue
<i>Auriporia aurulenta</i>	A. David, Tortic & Jelic	-	Abies alba	Polypore couleur d'or
<i>Bankera cinerea</i>	(Bull. : Fr.) Rauschert	Val	Abies alba	Hydne violet
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Bolet à beau pied
<i>Bondarzewia mesenterica</i>	(Schaeff.) Kreisel	-	Abies alba	Polypore des montagnes
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	-	.	Girolle améthyste
<i>Cantharellus friesii</i>	Quél., 1872	-	.	Chanterelle abricot
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	(O.F.Müll.) T.Macbr., 189	-	.	Fruticuleuse commune
<i>Ceriporia purpurea</i>	(Fr. : Fr.) Donk	Val	Fagus sylvatica	
<i>Clavulina cinerea</i>	(Bull. : Fr.) J. Schröt.	-	.	Clavaire cendré
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	-	.	Clavaire à crêtes
<i>Clavulina rugosa</i>	(Bull. : Fr.) J. Schröt.	-	.	Clavaire rugueuse
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe en entonnoir
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	.	Meunier
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie beurrée
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie en touffes
<i>Collybia peronata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	.	Marasme poivré
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	(L. : Fr.) Gray	-	.	Cortinaire à lames cannelle
<i>Cortinarius malachius</i>	(Fr. : Fr.) Fr., ss Fr., non	-	.	Cortinaire mauve
<i>Cortinarius orellanus</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire couleur de rocou
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire purpurescent
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	(Fr. : Fr.) Gillet	-	.	Cortinaire semi-sanguin
<i>Cortinarius torvus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire farouche ou à pied cou
<i>Cortinarius venetus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire verdâtre
<i>Craterellus cinereus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Chanterelle cendrée
<i>Craterellus sinuosus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Chanterelle sinueuse
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	.	Chanterelle en tube
<i>Crepidotus applanatus</i>	(Pers.) Kumm.	-	.	Crépidote aplani
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	-	Salix sp	Tramète rougissante
<i>Diatrype bullata</i>	(Hoffm. ex Fr.) Fr.	-	.	Diatrype en bulle
<i>Entoloma rhodopolium f. nidorosum</i>	(Fr.) Noordeloos	-	.	Entolome à odeur de nitre
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	Abies alba	Amadouvier des conifères
<i>Fuligo cinerea</i>	(Schwein.) Morgan, 1896	-	.	Fuligo gris cendré
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	-	.	Fleur de tan
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	-	Abies alba	Ganoderme luisant charnu
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	-	Fagus sylvatica	Ganoderme aplani
<i>Ganoderma valesiacum</i>	Boud.	Val	Abies alba	

**Liste des taxons répertoriés le : 28/08/2021**  
**sur le site : MOURGOUEILH (bois de)**

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	(Wulfen : Fr.) P.Karst.	-	Abies alba	Lenzite des clôtures
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	-	Abies alba	Flammule pénétrante
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	Cf	.	Pied de mouton
<i>Hydnum repandum f. rufescens</i>	.....	Cf	.	Pied de mouton roussâtre
<i>Hydnum rufescens</i>	Pers. : Fr.	Cf	.	Pied de mouton roux
<i>Hydropus marginellus</i>	(Pers. : Fr.) Singer	Val	.	Hydrope marginé
<i>Hymenochaete tabacina</i>	(Sowerby : Fr.) Lév.	-	Picea abies	Hyménochaète couleur de tabac
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Inocybe calamistrata</i>	(Fr. : Fr.) Gillet	-	.	Inocybe à base vert sombre
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	(Wahlenb. : Fr.) P.Karst.	-	Abies alba	Polypore à odeur de benjoin
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer &	-	Fagus sylvatica	Pholiote changeante
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	-	.	Laccaire à lames pâles
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Lactarius pallidus</i>	Pers. : Fr.	Val	.	Lactaire pâle
<i>Lactarius piperatus</i>	(L. : Fr.) Pers.	-	.	Lactaire poivré
<i>Lactarius rubrocinctus</i>	Fr., 1863	Val	.	Lactaire cerné de rouge
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	Abies alba	Lactaire saumoné
<i>Lactarius vellereus var. hometii</i>	(Gillet) Boud.	-	.	Lactaire velouté
<i>Laxitextum bicolor</i>	(Pers. : Fr.) Lentz, 1956	-	.	Stérée bicolore
<i>Leotia lubrica</i>	(Scop.) Pers. : Fr.	-	.	Léotie visqueuse
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Bousset & Josserand ex B	-	.	Lépiote à base rouge
<i>Lepiota ventriosospora</i>	D.A. Reid, 1958	-	.	Lépiote à spores ventruées
<i>Lepista inversa</i>	(Scop. : Fr.) Pat.	-	.	Clitocybe inversé
<i>Lycoperdon foetidum</i>	Bonord.	-	.	Vesse de loup fétide
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	.	Vesse de loup perlée
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Pers. : Pers.	-	.	Vesse de loup brun d'ombre
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	-	.	Coulemelle sombre
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme à odeur d'ail
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kottaba & P	-	.	Collybie à larges lames
<i>Mycena abramsii</i>	(Murrill) Murrill, 1916	-	.	Mycène de Abrams
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	Mycène en casque
<i>Mycena haematopus</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Mycène à lait rouge
<i>Mycena olivaceomarginata</i>	(Masse) Massee, 1893	-	.	Mycène à marge olivâtre
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	-	.	Mycène livide
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	-	.	Mycène pure
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	-	.	Mycène rose
<i>Nectriopsis violacea</i>	(J.C. Schmidt ex Fr. : Fr.)	Val	Fuligo sp	Nectrie violacé
<i>Neolentinus adhaerens</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Re	-	Abies alba	Lentin adhérent
<i>Otidea onotica</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel	-	.	Oreille de lièvre
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	-	.	Mucidule visqueuse
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	-	.	Paxille enroulé
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	-	.	Phalle impudique
<i>Phellodon niger</i>	(Fr. : Fr.) P.Karst.	-	.	Hydne noir
<i>Pholiota adiposa</i>	(Batsch : Fr.) Kumm.	-	.	Pholiote adipeuse
<i>Pholiota astragalina</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	Pholiote astragale
<i>Pholiota flammans</i>	(Batsch : Fr.) Kumm.	-	.	Pholiote incandescente
<i>Polyporus durus</i>	(Timm) Kreisel	-	.	Polypore bai
<i>Postia caesia</i>	(Schrad. : Fr.) P.Karst.	-	Abies alba	Polypore bleuté

**Liste des taxons répertoriés le : 28/08/2021**  
**sur le site : MOURGOUEILH (bois de)**

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Postia ptychogaster</i>	(F. Ludwig) Vesterh.	-	Abies alba	Polypore fuligineux
<i>Postia stiptica</i>	(Pers. : Fr.) Jülich	<b>Pro</b>	.	Leptopore blanchâtre
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982	-	Fagus sylvatica	Polypore blanc cendré
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 186	-	Abies alba	Hydne gélatineux
<i>Ramaria stricta</i>	(Pers. : Fr.) Quél.	-	.	Clavaire étroite
<i>Russula fellea</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Russule de fiel
<i>Russula fragrans</i>	Romagn., 1954	-	.	Russule laurier cerise
<i>Russula illota</i>	Romagn., 1954	-	.	Russule mal lavée
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	-	.	Russule noircissante
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	-	.	Russule ocre et blanc
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule olivacée
<i>Russula olivacea var. pavonina</i>	(Bres.) Reumaux ex Reum	-	.	
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	.	Scléroderme vulgaire
<i>Scutiger cristatus</i>	(Schaeff. : Fr.) Bondarze	-	.	Polypore à crête
<i>Skeletocutis amorpha</i>	(Fr. : Fr.) Kotlaba & Pou	-	.	Polypore amorphe
<i>Sparassis spathulata</i>	(Schwein. : Fr.) Fr.	-	.	Sparassis des sapins
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	Fagus sylvatica	Stérée hirsute
<i>Stereum subtomentosum</i>	Pouzar, 1964	-	Fagus sylvatica	Stérée presque tomenteuse
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	(Scop. : Fr.) Berk.	-	.	Bolet pomme de pin
<i>Trametes gibbosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Fagus sylvatica	Tramète bossue
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	Fagus sylvatica	Tramète versicolore
<i>Tricholoma filamentosum</i>	(Alessio) Alessio, 1988	-	.	Tricholome tigré filamenteux
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Bon, 1983	-	.	Tricholome qui fait cligner des ye
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome soufré
<i>Tricholomopsis decora</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	Abies alba	Tricholome décoré
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	Abies alba	Tricholome rutilant
<i>Tubifera ferruginosa</i>	(Batsch) J.F.Gmel., 1792	-	.	Tubifère ferrugineux
<i>Tylopilus felleus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	Bolet de fiel
<i>Xerocomus armeniacus</i>	(Quél.) Quél., 1888	<b>Val</b>	.	Bolet abricot
<i>Xerocomus pruinaeus</i>	(Fr.) Quél.	<b>Val</b>	.	Bolet pruineux
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	.	Collybie radicante
<i>Xerula radicata f. marginata</i>	(Konrad & Maubl.) R.H.	-	.	Collybie radicante à arêtes brun
<i>Xylaria polymorpha</i>	(Pers.) Grev., 1824	-	.	Xylaire polymorphe

Nombre de participants : 11

Nombre de taxons répertoriés : 126