

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 07/11/2021

Sur le site: SEMEAC (Bois de LABARTHE)

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Amanita citrina</i>	(Schaeff.) Pers., 1797	-	.	Amanite citrine
<i>Annulohyphoxylon minutellum</i>	(Syd. & P. Syd.) Y.M.Ju, J	-	.	
<i>Armillaria gallica</i>	Marxmüller & Romagn.	-	.	Armillaire bulbeuse
<i>Armillaria mellea</i>	(Vahl : Fr.) Kumm.	-	.	Armillaire couleur de miel
<i>Asterophora lycoperdoides</i>	Fr. : Fr.	-	.	Astérophore faux-lycoperdon
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	-	.	Girolle améthyste
<i>Cantharellus subpruinosis</i>	Eyssartier & Buyck	-	.	Girolle presque pruineuse
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	-	.	Pezize turquoise
<i>Clathrus archeri</i>	(Berk.) Dring, 1980	-	.	Anthurus d'Archer
<i>Clitocybe applanata</i>	(Fr.)	Val	.	
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	.	Meunier
<i>Crepidotus cesatii</i>	(Rabenh.) Sacc.	-	.	Crépidote à spores sphériques
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	-	.	Tramète rougissante
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew &	-	.	Tramète rougissante
<i>Diatrype disciformis</i>	(Hoffm. ex Fr.) Fr.	-	.	Diatrype en forme de pièce
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	.	Galère marginée
<i>Gyrodon lividus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	Bolet de l'aulne
<i>Hebeloma radicosum</i>	(Bull. : Fr.) Ricken	-	.	Hébélome radican
<i>Hohenbuehelia fluxilis var. grisea</i>	(Peck) P. Roux, 2008	-	.	
<i>Hymenochaete corrugata</i>	(Fr. : Fr.) Lév.	-	.	Hyménochaète du noisetier
<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	(Dicks. : Fr.) Lév., 1846	-	.	Hyménochaète rouillé
<i>Hyphoderma radula</i>	(Fr. : Fr.) Donk	-	.	
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	-	.	Hypoxylon en forme de fraise
<i>Hypoxylon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	
<i>Hypoxylon howeanum</i>	Peck, 1872	-	.	
<i>Irpex nitidus</i>	(Pers. : Fr.) Saarenoksa	-	.	Polypore lustré
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	-	.	Laccaire à lames pâles
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Lenzite du bouleau
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	-	.	Clitocybe nébuleux
<i>Macrolepiota mastoidea</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	Lépiote mamelonnée
<i>Marasmius hudsonii</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	
<i>Marasmius rotula</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme petite roue
<i>Meruliopsis corium</i>	(Pers. : Fr.) Ginns	-	.	Mérule papyracée
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	Mycène en casque
<i>Mycena galopus</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	
<i>Mycena haematopus</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Mycène à lait rouge
<i>Mycena inclinata</i>	(Fr.) Quél., 1872	-	.	Mycène inclinée
<i>Mycena polygramma</i>	(Bull. : Fr.) Gray	-	.	Mycène à pied strié
<i>Mycena vitilis</i>	(Fr.) Quél., 1872	-	.	Mycène à pied raide
<i>Panellus stipticus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	Panelle styptique
<i>Panellus stipticus var. albus</i>	(Bres.)	Val	Quercus	
<i>Peniophora lycii</i>	(Pers.) Höhn. & Litschauer	-	.	

Liste des taxons répertoriés le : 07/11/2021

Sur le site: SEMEAC (Bois de LABARTHE)

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Plicaturopsis crispa</i>	(Pers. : Fr.) D.A. Reid	-	.	Plicature du hêtre
<i>Ramaria stricta</i>	(Pers. : Fr.) Quéf.	-	.	Clavaire étroite
<i>Roridomyces roridus</i>	(Scop. : Fr.) Rexer	-	.	Mycène à pied gluant
<i>Russula betularum</i>	Hora, 1960	-	.	Russule du bouleau
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	-	.	Russule noircissante
<i>Schizopora paradoxa</i>	(Schrad. : Fr.) Donk	-	.	Schizopore paradoxale
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	.	Scléroderme vulgaire
<i>Scleroderma verrucosum</i>	(Bull. : Pers.) Pers.	-	.	Scléroderme verruqueux
<i>Skelotocutis nemoralis</i>	A. Korhonen et Miettinen	-	.	
<i>Stereum gausapatum</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Stérée pelucheuse
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	.	Stérée hirsute
<i>Stereum ochraceoflavum</i>	(Schwein.) J.B. Ellis	-	.	Stérée ocre pâle
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Trichaptum bifforme</i>	(Fr.) Ryvarden, 1972	-	.	Polypore parchemin
<i>Trichia varia</i>	(Pers. ex J.F. Gmel.) Pers.,	-	.	
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome à odeur de savon
<i>Trochila ilicina</i>	(Nees ex Fr.) Greenh. &	-	.	

Nombre de participants : 25

Nombre de taxons répertoriés : 61