

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 08/05/2022

Sur le site: RIOUMAJOU

| Taxons | | | Hôte | Nom français |
|--|----------------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------|
| <i>Aleurodiscus amorphus</i> | (Pers. : Fr.) Rabenh. | - | Abies alba | Corticie amorphe |
| <i>Amylostereum chailletii</i> | (Pers. : Fr.) Boidin | - | Abies alba | |
| <i>Auriscalpium vulgare</i> | Gray | - | Cone de pin | Hydne cure-oreille |
| <i>Baeospora myosura</i> | (Fr. : Fr.) Singer | - | Cone de pin | Collybie des cônes, Collybie queu |
| <i>Caloscypha fulgens</i> | (Pers. : Fr.) Boud. | - | Abies alba | Caloscyphe brillante |
| <i>Clitocybe paropsis</i> | (Fr.) Sacc. | - | . | Clitocybe vermiculaire |
| <i>Dacrymyces stillatus</i> | Nees : Fr. | - | Abies alba | Dacrymycète déliquescent |
| <i>Discina perlata</i> | (Fr.) Fr., 1849 | Pro | Abies alba | . |
| <i>Entoloma hirtipes</i> | (Schumach. : Fr.) Moser | - | . | Entolome hirsute |
| <i>Galerina marginata</i> | (Batsch) Kühner, 1935 | - | . | Galère marginée |
| <i>Gloeophyllum separium</i> | (Wulfen : Fr.) P.Karst. | - | Abies alba | Lenzite des clôtures |
| <i>Gyromitra esculenta</i> | (Pers. : Fr.) Fr. | - | . | Gyromitre dite comestible |
| <i>Hohenbuehelia albonigra</i> | (Pat.) Courtec. | - | Abies alba | |
| <i>Hypholoma capnoides</i> | (Fr. : Fr.) Kumm. | - | Abies alba | Hypholome doux |
| <i>Marasmius oreades</i> | (Bolt. : Fr.) Fr. | - | . | Faux mousseron |
| <i>Melanoleuca cognata</i> | (Fr.) Konrad & Maubl. | - | . | Melanoleuca reconnaissable |
| <i>Melanoleuca evenosa</i> | (Sacc.) Konrad & Maubl. | Cf | . | Mélanoleuca blanchâtre |
| <i>Melanoleuca grammopodia</i> | (Bull. : Fr.) Pat. | Cf | . | Melanoleuca à pied strié |
| <i>Morchella conica var. deliciosa</i> | (Fr. : Fr.) Phill. | - | Abies alba | |
| <i>Mycena arcangeliana</i> | Bres. | - | . | |
| <i>Mycena maculata</i> | P.Karst. | - | . | Mycène tachée |
| <i>Mycena pura</i> | (Pers. : Fr.) Kumm., 1871 | - | Abies alba | Mycène pure |
| <i>Mycena stipata</i> | Maas Geesteranus & Sch | - | Abies alba | Mycène en touffe |
| <i>Panaeolus foenicicii</i> | (Pers. : Fr.) Kühner | - | . | Paneole des moissons |
| <i>Panaeolus sphinctrinus</i> | (Fr.) Quél., 1872 | - | . | Panéole à marge dentée |
| <i>Peniophora piceae</i> | (Pers.) J. Erikss. | - | Abies alba | Peniophore du sapin |
| <i>Peniophora pithya</i> | (Pers.) J. Erikss. | - | Abies alba | Peniophore des conifères |
| <i>Phellinus hartigii</i> | (Allesch. & Schnabl) Pat. | - | Abies alba | Amadouvier du sapin |
| <i>Pholiota lenta</i> | (Pers. : Fr.) Singer | - | . | Pholiote glutineuse |
| <i>Piptoporus betulinus</i> | (Bull. : Fr.) P.Karst. | - | Betula sp | Polypore du bouleau |
| <i>Polyporus ciliatus</i> | Fr. : Fr. | - | . | Polypore cilié |
| <i>Skelotocutis nemoralis</i> | A. Korhonen et Miettinen | - | . | |
| <i>Stereum hirsutum</i> | (Willd. : Fr.) Pers., 1800 | - | . | Stérée hirsute |
| <i>Stereum sanguinolentum</i> | (Alb. & Schwein. : Fr.) Fr | - | Abies alba | Stérée sanguinolente |
| <i>Strobilurus tenacellus</i> | (Pers. : Fr.) Singer, 1962 | - | cone de pin | Collybie tenace |
| <i>Stropharia semiglobata</i> | (Batsch : Fr.) Quél., 1872 | - | . | Strophaire demi sphérique |
| <i>Tremella encephala</i> | Willd. : Fr. | - | Stereum sanguinolentu | Trémelle en forme de cervelle |
| <i>Trichaptum abietinum</i> | (Dicks. : Fr.) Ryvarden | - | Abies alba | Coriole du sapin |

Nombre de participants : 21

Nombre de taxons répertoriés : 38