

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 17/07/2022

Sur le site: PAYOLLE

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Acremonium lindnerii</i>	Kirsch.	-	Ganoderma lipsiense	
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Amanita umbrinolutea</i>	(Secrétan ex Gillet) Batail	<b>Pro</b>	.	Amanite à cerne sombre
<i>Amphinema byssoides</i>	(Pers. : Fr.) J. Erikss.	<b>Val</b>	Abies alba	
<i>Amylostereum chaillatii</i>	(Pers. : Fr.) Boidin	-	.	
<i>Annulohypoxydon cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.R	-	.	
<i>Arcyria denudata</i>	(L.) Wettst., 1886	-	.	
<i>Arcyria obvelata</i>	(Oeder) Onsberg, 1979	-	.	
<i>Ascodichaena rugosa</i>	Butin, 1977	-	.	
<i>Bankera cinerea</i>	(Bull. : Fr.) Rauschert	-	.	Hydne violet
<i>Bertia moriformis</i>	(Tode) De Not., 1844	-	.	Bertia en forme de mures
<i>Biscogniauxia mediterranea</i>	(De Not.) Kuntze	-	.	
<i>Biscogniauxia nummularia</i>	(Bull. : Fr.) Kuntze	-	.	Hypoxydon en forme de pièce de
<i>Boletus aestivalis</i>	(Paulet) Fr., 1838	-	.	Cèpe d'été, Cèpe réticulé
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Bolet à beau pied
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	-	.	Cèpe, Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Pied rouge
<i>Boletus erythropus var. discolor</i>	(Quélet) Dermek, Kuthan	-	.	Pied rouge décoloré
<i>Boletus luridus</i>	Schaeff. : Fr.	-	.	Bolet blafard
<i>Boletus subappendiculatus</i>	Dermek, Lazebnicek & Ve	-	.	Bolet des sapins
<i>Bondarzewia mesenterica</i>	(Schaeff.) Kreisel	-	.	Polypore des montagnes
<i>Calocera cornea</i>	(Batsch : Fr.) Fr., 1827	-	Fagus sylvatica	Calocère cornée
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Abies alba	Calocère visqueuse
<i>Cerrena unicolor</i>	(Bull. : Fr.) Murrill	-	.	Tramète unicolore
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	-	Fagus sylvatica	Pezize turquoise
<i>Chlorophyllum brunneum</i>	(Farl. & Burt) Vellinga, 2	-	.	Lépiote vénéneuse
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe en entonnoir
<i>Coltricia perennis</i>	(L. : Fr.) Gray	-	.	Coltricie
<i>Diatrype decorticata</i>	(Pers. : Fr.) Rappaz	-	Fagus sylvatica	
<i>Diatrype disciformis</i>	(Hoffm. ex Fr.) Fr.	-	Fagus sylvatica	Diatrype en forme de pièce
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	Fagus sylvatica	Amadouvier
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	Abies alba	Amadouvier des conifères
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	-	.	Fleur de tan
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	-	Abies alba	Ganoderme luisant charnu
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	-	Fagus sylvatica	Ganoderme aplani
<i>Hapalopilus rutilans</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	Fagus sylvatica	Polypore rutilant
<i>Henningsomyces candidus</i>	(Pers. : Fr.) Kuntze	-	Abies alba	
<i>Heterobasidium abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 199	-	.	Hétérobaside du sapin
<i>Hypoxydon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	-	.	Hypoxydon en forme de fraise
<i>Inonotus rheades</i>	(Pers.) P.Karst.	-	Betula sp	Polypore roux
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	(Wahlenb. : Fr.) P.Karst.	-	Abies alba	Polypore à odeur de benjoin
<i>Kretzschmaria deusta</i>	(Hoffm.) P.M.D.Martin, 1	-	.	Ustaline brûlée
<i>Lentinus tigrinus</i>	(Bull. : Fr.) Fr., 1825	-	.	Lentin tigré
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	-	.	Coulemelle sombre

# Liste des taxons répertoriés le : 17/07/2022

Sur le site: PAYOLLE

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	Fagus sylvatica	Marasme à odeur d'ail
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & P	-	Fagus sylvatica	Collybie à larges lames
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	-	Fagus sylvatica	Mucidule visqueuse
<i>Phallus impudicus</i>	L. : Pers.	-	.	Phalle impudique
<i>Phellinus hartigii</i>	(Allesch. & Schnabl) Pat.	-	.	Amadouvier du sapin
<i>Phellinus hartigii</i>	(Allesch. & Schnabl) Pat.	-	Abies alba	Amadouvier du sapin
<i>Pleurotus cornucopiae</i>	(Paulet) Quél.	-	Fagus sylvatica	Pleurote corne d'abondance
<i>Pluteus leoninus</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm.,	-	.	Plutée couleur de lion
<i>Pluteus tricuspidatus</i>	Velen.	-	Abies alba	Plutée à lame bordée de noir
<i>Polyporus leptcephalus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr., 1821	-	Fagus sylvatica	Polypore variable
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	-	Fagus sylvatica	Polypore cinabre
<i>Resinicium bicolor</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Pa	-	Abies alba	
<i>Russula delicata</i>	Fr., 1838	-	.	Russule "sans lait"
<i>Russula integra</i>	(L. : Fr.) Maire	-	.	Russule intègre
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule olivacée
<i>Russula violeipes f. citrina</i>	(Quél.) Romagn.	-	.	Russule à pied violet forme jaune
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	-	Fagus sylvatica	Schizophylle commune
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	.	Stérée hirsute
<i>Stereum insignitum</i>	Quél., 1889	-	.	Stérée remarquable
<i>Stereum sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	-	.	Stérée sanguinolente
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	-	Fagus sylvatica	Tramète hirsute
<i>Trametes pubescens</i>	(Schumach. : Fr.) Pilát	-	Fagus sylvatica	Tramète pubescente
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Trichaptum abietinum</i>	(Dicks. : Fr.) Ryvarden	-	.	Coriole du sapin
<i>Tricholoma matsutake</i>	S. Ito & Imai	-	.	
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	-	.	Bolet à chair jaune
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	.	Collybie radicante
<i>Xylaria hypoxylon</i>	(L. : Fr.) Grev.	-	Fagus sylvatica	Xylaire du bois

Nombre de participants : 18

Nombre de taxons répertoriés : 72