

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 28/08/2022

Sur le site: RIOUMAJOU

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Amanita excelsa</i> var. <i>spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat,	-	.	Amanite épaisse
<i>Amanita fuscoolivacea</i>	(Kühner ex Contu) Romag	Cf	.	
<i>Amanita muscaria</i>	(L. : Fr.) Lamarck	-	.	Amanite tue-mouche, fausse oron
<i>Amanita muscaria</i> var. <i>aureola</i>	(Kalchbr.) Quél.	-	.	Amanite tue-mouche dorée
<i>Amanita pantherina</i>	(DC. : Fr.) Krombh.	-	.	Amanite panthère
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. : Fr.) Redhead, Lut	-	.	Clitocybe à pied en massue
<i>Bolbitius tībubans</i> var. <i>vitellinus</i>	(Pers. : Fr.) Courtec., 200	-	.	Bolbitie jaune d'œuf
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Bolet à beau pied
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	-	.	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Pied rouge
<i>Boletus subappendiculatus</i>	Dernek, Lazebnicek & Ve	-	.	Bolet des sapins
<i>Bondarzewia mesenterica</i>	(Schaeff.) Kreisel	-	.	Polypore des montagnes
<i>Calocera cornea</i>	(Batsch : Fr.) Fr., 1827	-	.	Calocère cornée
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Calvatia utriformis</i>	(Bull. : Pers.) Jaap	-	.	Calvatie en outre
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	-	.	Girolle améthyste
<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr. : Fr.	-	.	Girolle, chanterelle
<i>Chalciporus piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille	-	.	Bolet poivré
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	-	.	Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe fragrans</i>	(With. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe anisé strié
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe en entonnoir
<i>Clitocybe odora</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe odorant, anisé
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	.	Meunier
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie beurrée
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	(L. : Fr.) Gray	-	.	Cortinaire à lames cannelle
<i>Cortinarius malicorius</i>	Fr., ss Fr., non ss Quélet	-	.	Cortinaire à chair olive
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire purpurescent
<i>Gastrum quadrifidum</i>	Pers. : Pers.	-	.	Géastre à quatre branches
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	-	.	Flammule pénétrante
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	-	.	Pied de mouton
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Inocybe fastigiata</i>	(Schaeff. : Fr.) Quél.	-	.	Inocybe fastigié
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i>	(Peck) Gillet, 1876	-	.	Inocybe terreux lilacin
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	(Wahlenb. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore à odeur de benjoin
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer & A	-	.	Pholiote changeante
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Lactarius intermedius</i>	(Fr. ?) Cooke	-	.	Lactaire du sapin blanc
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	.	Lactaire saumoné
<i>Lactarius scrobiculatus</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	-	.	Lactaire à fossettes
<i>Lactarius semisanguifluus</i>	Heim & Leclair	-	.	Lactaire semi-sanguin
<i>Lactarius vellereus</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire velouté
<i>Lentinellus lineolatus</i>	R.H. Petersen, 2004	-	.	
<i>Lepiota clypeolaria</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Lépiote en bouclier

Liste des taxons répertoriés le : 28/08/2022

Sur le site: RIOUMAJOU

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Lepiota cristata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	.	Lépiote crêtée
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Bousset & Josserand ex B	-	.	Lépiote à base rouge
<i>Lepiota ventriosospora</i>	D.A. Reid, 1958	-	.	Lépiote à spores ventruées
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	-	.	Clitocybe nébuleux
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Si	-	.	Cortinaire blanc bulbeux
<i>Leucopaxillus amarus</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Kü	-	.	Leucopaxille amer
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	.	Vesse de loup perlée
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	-	.	Faux mousseron
<i>Marasmius scorodoni</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme à odeur de poireau
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Po	-	.	Collybie à larges lames
<i>Morganella pyriformis</i>	(Schaeff. : Pers.) Kreisel	-	.	Vesse de loup en forme de poire
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	-	.	Mycène pure
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	-	.	Mycène rose
<i>Mycena zephrus</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Mycène taché
<i>Otidea onotica</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel	-	.	Oreille de lièvre
<i>Panaeolus sphinctrinus</i>	(Fr.) Quél., 1872	-	.	Panéole à marge dentée
<i>Pholiota adiposa</i>	(Batsch : Fr.) Kumm.	-	.	Pholiote adipeuse
<i>Pholiota flammans</i>	(Batsch : Fr.) Kumm.	-	.	Pholiote incandescente
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	-	.	Plutée couleur de cerf
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	-	.	Bolet porphyre
<i>Postia caesia</i>	(Schrad. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore bleuté
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 186	-	.	Hydne gélatineux
<i>Ramaria botrytis</i>	(Pers. : Fr.) Ricken	-	.	Clavaire chou-fleur
<i>Ramaria sanguinea</i>	(Pers.) Quél., 1888	-	.	Ramaire sanguine
<i>Rhizopogon roseolus</i>	(Corda) Th.Fr.	-	.	Rhizopogon rose pâle
<i>Rhodocybe nitellina</i>	(Fr.) Singer, 1947	-	.	Rhodocybe cuivré
<i>Rugosomyces carneus</i>	(Bull. : Fr.) Bon	-	.	Calocybe couleur de chair
<i>Russula badia</i>	Quél., 1881	-	.	Russule baie
<i>Russula cavipes</i>	Britzelm.	-	.	Russule à pied creux
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	-	.	Russule verdâtre
<i>Russula mairei</i>	Singer, 1929	-	.	
<i>Russula mustelina</i>	Fr., 1838	-	.	Russule belette
<i>Russula turci</i>	Bres.	-	.	Russule de Turco
<i>Scutigera cristatus</i>	(Schaeff. : Fr.) Bondarze	-	.	Polypore à crête
<i>Setulipes androsaceus</i>	(L. : Fr.) Antonin	-	.	Marasme androsace
<i>Spathularia flavida</i>	Pers. : Fr.	-	.	Spatulaire jaune
<i>Stropharia semiglobata</i>	(Batsch : Fr.) Quél., 1872	-	.	Strophaire demi sphérique
<i>Suillus granulatus</i>	(L. : Fr.) Roussel	-	.	Bolet granulé
<i>Suillus grevillei</i>	(Klotzsch : Fr.) Singer	-	.	Bolet élégant
<i>Suillus luteus</i>	(L. : Fr.) Roussel	-	.	Nonette voilée
<i>Tricholoma bufonium</i>	(Pers. : Fr.) Gillet	-	.	Tricholome pourpré
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Bon, 1983	-	.	Tricholome qui fait cligner des ye
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome soufré
<i>Tricholomopsis decora</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome décoré
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome rutilant
<i>Tubifera ferruginosa</i>	(Batsch) J.F.Gmel., 1792	-	.	Tubifère ferrugineux
<i>Vascellum pratense</i>	(Pers. : Pers.) Kreisel	-	.	Vesse de loup à diaphragme
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	-	.	Bolet bai

Liste des taxons répertoriés le : 28/08/2022

Sur le site: RIOUMAJOU

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	-	.	Bolet à chair jaune
<i>Xeromphalina campanella</i>	(Batsch : Fr.) Kühner &	-	.	Omphale clochette

Nombre de participants : 13

Nombre de taxons répertoriés : 94