

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 11/09/2022

Sur le site: PAYOLLE

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Amanita excelsa</i> var. <i>spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat,	-	.	Amanite épaisse
<i>Amanita muscaria</i> f. <i>flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Pouma	-	.	Amanite tue-mouche à voile jaunâ
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Amanita rubescens</i> f. <i>annulosulfurea</i>	(Gillet) E.-J. Gilbert	-	.	Golmotte à anneau jaune
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	-	.	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Pied rouge
<i>Boletus luridus</i>	Schaeff. : Fr.	-	.	Bolet blafard
<i>Boletus subappendiculatus</i>	Dermek, Lazebnicek & Ve	-	.	Bolet des sapins
<i>Chalciporus piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille	-	.	Bolet poivré
<i>Clitocybula lacerata</i>	(Scop.) Métrod ex Singer	-	.	Collybie lacérée
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	.	Meunier
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	.	Amadouvier des conifères
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	-	.	Ganoderme luisant charnu
<i>Gomphus clavatus</i>	(Pers. : Fr.) Gray	-	.	Chanterelle violette
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Hypomyces lateritius</i>	(Fr. : Fr.) Tul. & C.Tul., 1	-	.	
<i>Inocybe fastigiata</i>	(Schaeff. : Fr.) Quél.	Cf	.	Inocybe fastigié
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm.,	-	.	Inocybe à lames terreuses
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	(Wahlenb. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore à odeur de benjoin
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire muqueux
<i>Lactarius blennius</i> f. <i>virescens</i>	J.E. Lange, 1940	-	.	Lactaire muqueux
<i>Lactarius fuliginosus</i>	(Fr.) Fr., 1838	Cf	.	Lactaire enfumé
<i>Lactarius intermedius</i>	(Fr. ?) Cooke	-	.	Lactaire du sapin blanc
<i>Lactarius pallidus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Lactaire pâle
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	.	Lactaire saumoné
<i>Lactarius vellereus</i> var. <i>hometii</i>	(Gillet) Boud.	-	.	Lactaire velouté
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Bousset & Josserand ex B	-	.	Lépiote à base rouge
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	.	Vesse de loup perlée
<i>Lyophyllum decastes</i>	(Fr. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome agrégé
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	-	.	Coulemelle sombre
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & P	-	.	Collybie à larges lames
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	Mycène en casque
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	-	.	Mycène livide
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	-	.	Mycène pure
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	-	.	Mucidule visqueuse
<i>Pholiota limonella</i>	(Peck) Sacc., 1887	-	.	Pholiote jaune citron
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore du bouleau
<i>Pluteus tricuspidatus</i>	Velen.	-	.	Plutée à lame bordée de noir
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	-	.	Bolet porphyre
<i>Postia caesia</i>	(Schrad. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore bleuté
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore cinabre
<i>Ramaria sanguinea</i>	(Pers.) Quél., 1888	-	.	Ramaire sanguine
<i>Russula albonigra</i>	(Krombh.) Fr.	-	.	Russule blanche et noire

# Liste des taxons répertoriés le : 11/09/2022

Sur le site: PAYOLLE

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Russula amethystina</i>	Quél., 1898	- .		Russule améthyste
<i>Russula badia</i>	Quél., 1881	- .		Russule baie
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	- .		Russule verdâtre
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	- .		Russule charbonnière
<i>Russula fageticola</i>	Melzer ex S.Lundell, 1956	- .		Russule du hêtre
<i>Russula fellea</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	- .		Russule de fiel
<i>Russula integra</i>	(L. : Fr.) Maire	- .		Russule intègre
<i>Russula lepida</i>	Fr., 1836	- .		Russule jolie
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	- .		Russule noircissante
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	- .		Russule olivacée
<i>Russula queletii</i>	Fr., 1872	- .		Russule de Quelet
<i>Sparassis spathulata</i>	(Schwein. : Fr.) Fr.	- .		Sparassis des sapins
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	- .		Tramète hirsute
<i>Tricholoma boudieri</i>	(Barla) Barla	- .		Tricholome de Boudier
<i>Tricholoma matsutake</i>	S. Ito & Imai	- .		
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Bon, 1983	- .		Tricholome qui fait cligner des ye
<i>Tricholomopsis decora</i>	(Fr. : Fr.) Singer	- .		Tricholome décoré
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	- .		Tricholome rutilant
<i>Vascellum pratense</i>	(Pers. : Pers.) Kreisel	- .		Vesse de loup à diaphragme
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	- .		Bolet bai
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	- .		Bolet à chair jaune
<i>Xerula melanotricha</i>	Dörfelt, 1979	- .		Collybie à poils noirs
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	- .		Collybie radicante

Nombre de participants : 14

Nombre de taxons répertoriés : 67