

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 15/10/2022

Sur le site: **CHIROULET**

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. : Fr.) Redhead, Lut	-	.	Clitocybe à pied en massue
<i>Armillaria cepistipes</i>	Velen.	-	.	Armillaire à pied clavé
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	-	.	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Pied rouge
<i>Calvatia excipuliformis</i>	(Scop. : Pers.) Perdeck	-	.	Calvatie en coupe
<i>Clitocybe rivulosa</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe blanchi
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	.	Meunier
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie beurrée
<i>Collybia peronata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	.	Marasme poivré
<i>Coprinus micaceus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	.	Coprin micacé
<i>Cortinarius atrovirens</i>	Kalchbr.	-	.	Cortinaire vert foncé
<i>Cortinarius infractus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire à marge brisée
<i>Cortinarius largus</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire large
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire purpurescent
<i>Cortinarius splendens</i>	R. Henry ex R. Henry	-	.	Cortinaire splendide
<i>Entoloma incanum</i>	(Fr. : Fr.) Hesler	-	.	Entolome à pied vert
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Amadouvier
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	.	Amadouvier des conifères
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	Abies alba	Galère marginée
<i>Geastrum saccatum</i>	Fr., 1829	-	.	Géastre en forme de sac
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	-	.	Flammule pénétrante
<i>Helvella crispa</i>	(Scop.) : Fr.	-	.	Helvelle crépue
<i>Heterobasidion abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 199	-	Abies alba	Hétérobaside du sapin
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	-	.	Pied de mouton
<i>Hygrocybe chlorophana</i>	(Fr. : Fr.) Wünsche	-	.	Hygrocybe jaune verdâtre brillan
<i>Hygrocybe psittacina</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	-	.	Hygrophore perroquet
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	-	.	Fausse girolle
<i>Hygrophorus pudorinus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Hygrophore pudibond
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Inocybe cervicolor</i>	(Pers.) Quél., 1886	-	.	Inocybe couleur de cerf
<i>Inocybe geophylla</i>	(Sowerby : Fr.) P.Kumm.,	-	.	Inocybe à lames terreuses
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer &	-	.	Pholiotte changeante
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Lactarius intermedius</i>	(Fr. ?) Cooke	-	.	Lactaire du sapin blanc
<i>Lactarius rufus</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	-	.	Lactaire roux
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	.	Lactaire saumoné
<i>Leccinum floccopus</i>	(E.-J. Gilbert) Redeuilh, 1	-	.	Bolet orangé terne
<i>Leccinum scabrum</i>	(Bull. : Fr.) Gray	-	.	Bolet rude
<i>Lepiota cristata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	.	Lépiote crêtée
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Bousset & Josserand ex B	-	.	Lépiote à base rouge
<i>Lepiota ventriosospora</i>	D.A. Reid, 1958	-	.	
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	-	.	Clitocybe nébuleux
<i>Lepista nuda</i>	(Bull. : Fr.) Cooke	-	.	Pied bleu
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	.	Vesse de loup perlée

Liste des taxons répertoriés le : 15/10/2022

Sur le site: CHIROULET

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	- .		Coulemelle sombre
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	- .		Marasme à odeur d'ail
<i>Mycena crocata</i>	(Schrad. : Fr.) Kumm.	- .		Mycène à lait orangé
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	- .		Mycène pure
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	- .		Mycène rose
<i>Otidea onotica</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel	- .		Oreille de lièvre
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	- .		Mucidule visqueuse
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	- .		Paxille enroulé
<i>Peziza varia</i>	(Hedw. ex Fr.) Fr.	Cf .		Pezize variable
<i>Pleurotus ostreatus</i>	(Jacq.) Kumm., 1871	- .		Pleurote en huître
<i>Pluteus tricuspidatus</i>	Velen.	- .		Plutée à lame bordée de noir
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	- .		Polypore cinabre
<i>Rhodocybe gemina</i>	(Paulet ex Fr.) Kuyper &	- .		Rhodocybe tronqué
<i>Russula cavipes</i>	Britzelm.	- .		Russule à pied creux
<i>Russula fageticola</i>	Melzer ex S.Lundell, 1956	- .		Russule du hêtre
<i>Russula faginea</i>	Romagn. ex Romagn.	- .		Russule écrevisse des hêtres
<i>Russula integra</i>	(L. : Fr.) Maire	- .		Russule intègre
<i>Russula lepida</i>	Fr., 1836	- .		Russule jolie
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	- .		Russule olivacée
<i>Russula risigallina</i>	(Batsch) Sacc., 1915	- .		Russule caméléon
<i>Suillus grevillei</i>	(Klotzsch : Fr.) Singer	- .		Bolet élégant
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	- .		Tricholome soufré
<i>Vascellum pratense</i>	(Pers. : Pers.) Kreisel	- .		Vesse de loup à diaphragme
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	- .		Bolet bai
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) QuéL., 1888	- .		Bolet à chair jaune

Nombre de participants : 0

Nombre de taxons répertoriés : 69