

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 06/11/2022

Sur le site: BERGONS (forêt d ARRAGNAT)

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Abortiporus fractipes</i>	(Berk. & M.A.Curtis) Gilb	- .	Hétéropore à pied brisé
<i>Agaricus langei</i>	(F.H. Møller) F.H. Møller	- .	Agaric rougissant
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat,	- .	Amanite épaisse
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877	- .	Amanite jonquille
<i>Amanita muscaria f. flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Pouma	- .	Amanite tue-mouche à voile jaunâ
<i>Amanita muscaria var. aureola</i>	(Kalchbr.) Quél.	- .	Amanite tue-mouche dorée
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	- .	Golmotte, amanite vineuse
<i>Annulohyphoxylon cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.R	- Fagus sylvatica	
<i>Armillaria mellea</i>	(Vahl : Fr.) Kumm.	- .	Armillaire couleur de miel
<i>Auriporia aurulenta</i>	A. David, Tortic & Jelic	- Picea abies	Polypore couleur d'or
<i>Baeospora myosura</i>	(Fr. : Fr.) Singer	- strobe de Picea abies	Collybie des cônes, Collybie queu
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E.	- .	Bisporelle citrine
<i>Bjerkandera adusta</i>	(Willd. : Fr.) P.Karst., 18	- Fagus sylvatica	Polypore brûlé
<i>Boletus aestivalis</i>	(Paulet) Fr., 1838	- .	Cèpe d'été, Cèpe réticulé
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	- .	Bolet à beau pied
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	- .	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus erythropus var. discolor</i>	(Quélet) Dermek, Kuthan	- .	Pied rouge décoloré
<i>Boletus luridus</i>	Schaeff. : Fr.	- .	Bolet blafard
<i>Boletus pinophilus</i>	Pilát & Dermek, 1973	- .	Cèpe des pins
<i>Boletus rubrosanguineus</i>	(Walty) ex Cheype	- .	Bolet rouge sang
<i>Bulgaria inquinans</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- .	Bulgarie salissante
<i>Calocera cornea</i>	(Batsch : Fr.) Fr., 1827	- .	Calocère cornée
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- .	Calocère visqueuse
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	- .	Pezize turquoise
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	- .	Meunier
<i>Collybia filamentosa</i>	Velen.	- .	
<i>Coniophora puteana</i>	(Schumach. : Fr.) P.Karst	- Picea abies	coniophore bosselé
<i>Coprinus atramentarius</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	- .	Coprin noir d'encre
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	- .	Chanterelle en tube
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	- .	Tramète rougissante
<i>Diatrype decorticata</i>	(Pers. : Fr.) Rappaz	- Fagus sylvatica	
<i>Exidia thuretiana</i>	(Lév.) Fr.	- .	Exidie blanche
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	- .	Amadouvier
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	- .	Amadouvier des conifères
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	- .	Galère marginée
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	(Wulfen : Fr.) P.Karst.	- .	Lenzite des clôtures
<i>Hemimycena cucullata</i>	(Pers. : Fr.) Singer	- feuilles	Mycène blanc de gypse
<i>Heterobasidion abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 199	- Abies alba	Hétérobaside du sapin
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	- .	Fausse girolle
<i>Hymenochaete corrugata</i>	(Fr. : Fr.) Lév.	- Corylus avellana	Hyménochaète du noisetier
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	- .	Hypholome en touffe
<i>Hypocrea pulvinata</i>	Fuckel, 1870	- Piptoporus betulinus	Hypocrée en coussin
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	- Fagus sylvatica	Hypoxylon en forme de fraise
<i>Hypoxylon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	- Corylus avellana	

Liste des taxons répertoriés le : 06/11/2022

Sur le site: ... Non déterminé

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Irpex fimbriatus</i>	(Pers. : Fr.) Kotiranta &	-	.	Steccherine fimbriée
<i>Lactarius deterrimus</i>	Gröger, 1968	-	.	Lactaire de l'épicéa
<i>Lactarius hyginus</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire court, L rouge orange
<i>Lepista inversa</i>	(Scop. : Fr.) Pat.	-	.	Clitocybe inversé
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	-	.	Clitocybe nébuleux
<i>Leucoagaricus holosericeus</i>	(Fr. ? Gillet) Moser ex M	-	.	Lépiote soyeuse
<i>Leucogyrophana mollusca</i>	(Fr. : Fr.) Pouzar	-	.	
<i>Lycoperdon echinatum</i>	Pers. : Pers.	-	.	Vesse de loup hérisson
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	.	Vesse de loup perlée
<i>Macrotyphula fistulosa var. contorta</i>	(Holmskjöld : Fr.) Nannf.	-	Fagus sylvatica	
<i>Marasmiellus ramealis</i>	(Bull. : Fr.) Singer, 1946	-	.	Marasme des ramilles
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius scorodoni</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme à odeur de poireau
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	Mycène en casque
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	-	.	Paxille enroulé
<i>Phlebia merismoides</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Phlébie orangée
<i>Phlebiella vaga</i>	(Fr. : Fr.) P.Karst.	-	.	
<i>Pholiota squarrosa</i>	(Oeder : Fr.) Kumm.	-	.	Pholiote écailleuse
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore du bouleau
<i>Plicaturopsis crispa</i>	(Pers. : Fr.) D.A. Reid	-	.	Plicature du hêtre
<i>Postia caesia</i>	(Schrad. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore bleuté
<i>Rozites caperatus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	.	Pholiote ridée
<i>Russula aeruginea</i>	Lindblad	-	.	Russule vert de gris
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	-	.	Russule verdâtre
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule charbonnière
<i>Russula delicata</i>	Fr., 1838	-	.	Russule "sans lait"
<i>Russula subfoetens</i>	W.G. Smith	-	.	Russule presque fétide
<i>Russula vesca</i>	Fr., 1836	-	.	Russule comestible
<i>Sarcomyxa serotina</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	Fagus sylvatica	Pleurote tardif
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	-	.	Schizophylle commune
<i>Skelotocutis nemoralis</i>	A. Korhonen et Miettinen	-	.	
<i>Steccherinum ochraceum</i>	(Pers.) Gray, 1821	-	.	Hydne ocré
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	Corylus avellana	Stérée hirsute
<i>Stereum insignitum</i>	Quél., 1889	-	Fagus sylvatica	Stérée remarquable
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	-	Fagus sylvatica	Tramète hirsute
<i>Trametes pubescens</i>	(Schumach. : Fr.) Pilát	-	Fagus sylvatica	Tramète pubescente
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	-	.	Bolet bai
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	.	Collybie radicante

Nombre de participants : 14

Nombre de taxons répertoriés : 83