

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 03/12/2022

Sur le site: ... Non déterminé

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Agaricus campestris</i>	L. : Fr., 1753	-	.	Agaric champêtre, Rosé des prés
<i>Amanita citrina</i>	(Schaeff.) Pers., 1797	-	.	Amanite citrine
<i>Amanita muscaria var. aureola</i>	(Kalchbr.) Quél.	-	.	Amanite tue-mouche dorée
<i>Auriscalpium vulgare</i>	Gray	-	.	Hydne cure-oreille
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	-	.	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Calocera cornea</i>	(Batsch : Fr.) Fr., 1827	-	.	Calocère cornée
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Cerocorticium molare</i>	(Chaillot : Fr.) Jülich & S	-	Quercus	
<i>Climacodon pulcherrimus</i>	(Berk. & M.A.Curtis) Niko	-	.	
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie beurrée
<i>Collybia cirrhata</i>	(Pers.) Quél.	-	.	Collybie mycophage
<i>Collybia fusipes</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	.	Collybie à pied en fuseau
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	.	Chanterelle en tube
<i>Crepidotus calolepis</i>	(Fr.) P.Karst.	-	.	Crépidote à belles écailles
<i>Diatrype stigma</i>	(Hoffm. ex Fr.) Fr.	-	Quercus	Diatrype en croûte
<i>Exidia nigricans</i>	P. Roberts (2009)	-	Quercus	Exidie glanduleuse
<i>Fomes fomentarius</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Amadouvier
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	-	.	Flammule pénétrante
<i>Gymnopilus spectabilis</i>	(Weinmann : Fr.) Singer	-	.	Pholiote remarquable
<i>Hebeloma sinapizans</i>	(Paulet ex Fr.) Gillet	-	.	Hébélome échaudé
<i>Hjortstamia crassa</i>	(Lév.) Boidin & G. Gilles	-	Quercus	
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	-	.	Fausse girolle
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	-	.	Laccaire à lames pâles
<i>Lactarius quietus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Lactaire tranquille
<i>Laxitextum bicolor</i>	(Pers. : Fr.) Lentz, 1956	-	.	Stérée bicolore
<i>Leccinum aurantiacum</i>	(Bull.) Gray	-	.	Bolet orangé, trémoulet
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Lenzite du bouleau
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	-	.	Clitocybe nébuleux
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	-	.	Lait de loup
<i>Mycena aetites</i>	(Fr.) Quél., 1872	-	.	Mycène gris-brun
<i>Mycena epipterygia</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	Mycène des fougères
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	Mycène en casque
<i>Mycena galopus</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	
<i>Mycena inclinata</i>	(Fr.) Quél., 1872	-	.	Mycène inclinée
<i>Mycena vitilis</i>	(Fr.) Quél., 1872	-	.	Mycène à pied raide
<i>Panellus stipticus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	Quercus	Panelle styptique
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	-	.	Paxille enroulé
<i>Peniophora quercina</i>	(Pers. : Fr.) Cooke	-	Quercus	Peniophore du chêne
<i>Phlebia merismoides</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Phlébie orangée
<i>Pholiota lenta</i>	(Pers. : Fr.) Singer	-	.	Pholiote glutineuse
<i>Plicaturopsis crispa</i>	(Pers. : Fr.) D.A. Reid	-	.	Plicature du hêtre
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	-	.	Plutée couleur de cerf
<i>Postia subcaesia</i>	(A. David) Jülich, 1982	-	.	Polypore bleuté

# Liste des taxons répertoriés le : 03/12/2022

Sur le site: ... Non déterminé

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Psathyrella candolleana</i>	(Fr.) Maire, 1937	-	.	Psathyrelle de De Candolle
<i>Psathyrella piluliformis</i>	(Bull.) P.D.Orton, 1969	-	.	Psathyrelle hydrophile
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	(Bull. : Fr.) Singer	-	.	Clitocybe en vase
<i>Russula graveolens</i>	Romell, 1885	-	.	Russule malodorante
<i>Russula risigallina</i>	(Batsch) Sacc., 1915	-	.	Russule caméléon
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	-	.	Schizophylle commune
<i>Schizopora paradoxa</i>	(Schrad. : Fr.) Donk	-	.	Schizopore paradoxale
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	.	Scléroderme vulgaire
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	.	Stérée hirsute
<i>Stereum ochraceoflavum</i>	(Schwein.) J.B. Ellis	-	.	Stérée ocre pâle
<i>Suillus luteus</i>	(L. : Fr.) Roussel	-	.	Nonette voilée
<i>Suillus variegatus</i>	(Swartz : Fr.) Richon & R	-	.	Bolet tacheté
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	-	.	Tramète hirsute
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Tremella mesenterica</i>	Retz. : Fr., 1769	-	.	Trémelle mésentérique
<i>Trichaptum bifforme</i>	(Fr.) Ryvarde, 1972	-	.	Polypore parchemin
<i>Xylaria hypoxylon</i>	(L. : Fr.) Grev.	-	.	Xylaire du bois

Nombre de participants : 19

Nombre de taxons répertoriés : 61