

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 18/12/2022

Sur le site: IBOS (Serre Caute)

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Agaricus moelleri</i>	Wasser, 1976	-	.	Agaric pintade
<i>Aleurodiscus wakefieldiae</i>	Boidin & Beller, 1967	-	Quercus rubra	Corticie de Wakefield
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877	-	.	Amanite jonquille
<i>Amanita muscaria var. aureola</i>	(Kalchbr.) Quél.	-	.	Amanite tue-mouche dorée
<i>Amanita phalloides</i>	(Fr. : Fr.) Link	-	.	Amanite phalloïde
<i>Annulohypoxydon minutellum</i>	(Syd. & P. Syd.) Y.M.Ju, J	Val	Quercus rubra	
<i>Annulohypoxydon multifforme</i>	(Fr. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.Ro	-	Betula sp	Hypoxydon multifforme
<i>Armillaria ostoyae</i>	(Romagn.) Herink, 1973	-	Pinus sp	Armillaire d'Ostoya
<i>Ascocoryne sarcoides</i>	(Jacq. ex Fr.) J.W.Groves	-	Betula sp	Ascocoryne sarcoïde
<i>Bjerkandera adusta</i>	(Willd. : Fr.) P.Karst., 18	-	Betula sp	Polypore brûlé
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	-	.	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Botryobasidium laeve</i>	(J. Erikss.) Parmasto	Val	Betula sp	
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Chlorophyllum brunneum</i>	(Farl. & Burt) Vellinga, 2	-	.	Lépiote vénéneuse
<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuyper, 1981	-	.	Clitocybe à odeur de poulailler
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie beurrée
<i>Coniophora puteana</i>	(Schumach. : Fr.) P.Karst	-	Pinus sp	coniophore bosselé
<i>Cordyceps militaris</i>	(L. : Fr.) Link	-	.	Cordyceps militaire
<i>Crepidotus applanatus</i>	(Pers.) Kumm.	-	Pinus sp	Crépidote aplani
<i>Cylindrobasidium laeve</i>	(Pers. : Fr.) Chamuris	Val	Pinus sp	
<i>Cylindrobasidium laeve</i>	(Pers. : Fr.) Chamuris	-	Quercus rubra	
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.	Val	Pinus sp	Dacrymycète déliquescent
<i>Dacrymyces variisporus</i>	McNabb, 1973	Val	Pinus sp	Dacrymycète à pores variables
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	(Bolt. : Fr.) J. Schröt.	-	Betula sp	Tramète rougissante
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew &	-	Betula sp	Tramète rougissante
<i>Diatrypella quercina</i>	(Pers.) Cooke, 1866	Val	Quercus	
<i>Ditiola pezizaeformis</i>	(Lév.) D.A. Reid	Val	Betula sp	Ditiole en forme de pezize
<i>Exidia nigricans</i>	P. Roberts (2009)	-	Betula sp	Exidie glanduleuse
<i>Exidia nigricans</i>	P. Roberts (2009)	-	Pinus sp	Exidie glanduleuse
<i>Exidia nucleata</i>	(Schwein. : Fr.) Burt, 192	-	.	Exidie à noyau
<i>Exidia saccharina</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	-	Pinus sp	Exidie couleur de sucre
<i>Funalia gallica</i>	(Fr. : Fr.) Bondarzew & S	Val	Fraxinus excelsior	Tramète des Gaules
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	.	Galère marginée
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	-	Pinus sp	Flammule pénétrante
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	-	.	Fausse girolle
<i>Hygrophoropsis aurantiaca var. pallida</i>	(Cooke) Kühner & Romag	-	.	Fausse girolle pâle
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Hypholoma fasciculare var. pusillum</i>	J.E. Lange, 1923	-	.	Hypholome en touffe nain
<i>Hypholoma lateritium</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	-	.	Hypholome couleur de brique
<i>Hypoxydon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Corylus avellana	
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Lenzite du bouleau
<i>Lepista inversa</i>	(Scop. : Fr.) Pat.	-	.	Clitocybe inversé
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	-	.	Clitocybe nébuleux
<i>Leucogyrophana mollusca</i>	(Fr. : Fr.) Pouzar	-	.	

Liste des taxons répertoriés le : 18/12/2022

Sur le site: IBOS (Serre Caute)

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	-	.	Lait de loup
<i>Macrotiophyla fistulosa</i> var. <i>contorta</i>	(Holmskjöld : Fr.) Nannf.	-	.	
<i>Marasmiellus ramealis</i>	(Bull. : Fr.) Singer, 1946	-	.	Marasme des ramilles
<i>Meruliopsis corium</i>	(Pers. : Fr.) Ginns	-	.	Mérule papyracée
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	Mycène en casque
<i>Mycena inclinata</i>	(Fr.) Quél., 1872	-	.	Mycène inclinée
<i>Mycena speirea</i>	(Fr. : Fr.) Gillet	-	.	Mycène groupé
<i>Mycena vitilis</i>	(Fr.) Quél., 1872	-	.	Mycène à pied raide
<i>Panellus stipticus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	Quercus	Panelle styptique
<i>Paxillus involutus</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	-	.	Paxille enroulé
<i>Peniophora cinerea</i>	(Pers. : Fr.) Cooke, 1879	-	.	Peniophore cendrée
<i>Phellinus laevigatus</i>	(Fr. ? P.Karst.) Bourdot	-	Betula sp	
<i>Phlebia merismoides</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	Betula sp	Phlébie orangée
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	Betula sp	Polypore du bouleau
<i>Plicaturopsis crispa</i>	(Pers. : Fr.) D.A. Reid	-	Betula sp	Plicature du hêtre
<i>Postia pythogaster</i>	(F. Ludwig) Vesterh.	-	.	Polypore fuligineux
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982	-	.	Polypore blanc cendré
<i>Pseudoclitocybe cyathiformis</i>	(Bull. : Fr.) Singer	-	.	Clitocybe en vase
<i>Rickenella mellea</i>	(Singer & Cléménçon) La	-	.	Omphale couleur de miel
<i>Russula amara</i>	Kucera	-	.	Russule amère
<i>Russula cessans</i>	A. Pearson, 1950	Pro	.	Russule tardive
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	-	.	Russule verdâtre
<i>Russula delica</i>	Fr., 1838	-	.	Russule "sans lait"
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	-	Betula sp	Schizophylle commune
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	-	Pinus sp	Schizophylle commune
<i>Schizopora paradoxa</i>	(Schrad. : Fr.) Donk	-	Quercus	Schizopore paradoxale
<i>Sidera vulgaris</i>	(Fr. : Fr.) Miettinen, 2011	-	Pinus sp	
<i>Simocybe sumptuosa</i>	(P.D. Orton) Singer, 1962	-	.	Naucorie luxuriante
<i>Skeletocutis amorpha</i>	(Fr. : Fr.) Kotlaba & Pou	-	Pinus sp	Polypore amorphe
<i>Stereum gausapatum</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	Quercus	Stérée pelucheuse
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	Betula sp	Stérée hirsute
<i>Stereum ochraceoflavum</i>	(Schwein.) J.B. Ellis	-	Quercus rubra	Stérée ocre pâle
<i>Stereum sanguinolentum</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	-	Pinus sp	Stérée sanguinolente
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	-	Quercus rubra	Tramète hirsute
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Trichaptum bifforme</i>	(Fr.) Ryvarden, 1972	-	Betula sp	Polypore parchemin
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome soufré
<i>Tubulicrinis medius</i>	(Bourdot & Galzin) Ober	Val	Pinus sp	
<i>Vuilleminia comedens</i>	(Nees : Fr.) Maire	-	.	Vuilleminie commun
<i>Xerocomus badius</i>	(Fr. : Fr.) Kühner ex E.-J.	-	.	Bolet bai
<i>Xylodon flaviporus</i>	(Berk. & M.A.Curtis ex C	-	Pinus sp	Schizopore à pore jaune
<i>Xylodon sambuci</i>	(Pers.) Tura, Zmitr., Wass	Val	Pinus sp	

Nombre de participants : 12

Nombre de taxons répertoriés : 86