

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 29/05/2023

Sur le site: **CHIROULET**

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Agaricus silvaticus</i>	Schaeff., 1774	Cf	.	Agaric des forêts
<i>Agrocybe praecox</i>	(Pers. : Fr.) Fayod, 1889	-	.	Pholiote précoce
<i>Aleurodiscus amorphus</i>	(Pers. : Fr.) Rabenh.	-	.	Corticie amorphe
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877	-	.	Amanite jonquille
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Amylostereum chailletii</i>	(Pers. : Fr.) Boidin	-	Abies alba	
<i>Annulohyoxylon cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.R	-	.	
<i>Ascodichaena rugosa</i>	Butin, 1977	-	.	
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E.	-	.	Bisporelle citrine
<i>Bjerkandera adusta</i>	(Willd. : Fr.) P.Karst., 18	-	.	Polypore brûlé
<i>Bolbitius tībubans var. vitellinus</i>	(Pers. : Fr.) Courtec., 200	-	.	Bolbitie jaune d'œuf
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Pied rouge
<i>Calocera cornea</i>	(Batsch : Fr.) Fr., 1827	-	Fagus sylvatica	Calocère cornée
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	(O.F.Müll.) T.Macbr., 189	-	.	Fruticuleuse commune
<i>Clitocybe fragrans</i>	(With. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe anisé strié
<i>Collybia aquosa</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie aqueuse
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie beurrée
<i>Collybia fuscopurpurea</i>	(Pers. : Fr.) Kummer, ss	Val	.	.
<i>Collybia ocior</i>	(Pers.) Vilgalys & O.K. M	-	.	
<i>Crepidotus cesatii</i>	(Rabenh.) Sacc.	Val	.	Crépidote à spores sphériques
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.	-	Abies alba	Dacrymycète déliquescant
<i>Diatrype decorticata</i>	(Pers. : Fr.) Rappaz	-	.	
<i>Diatrype disciformis</i>	(Hoffm. ex Fr.) Fr.	-	Fagus sylvatica	Diatrype en forme de pièce
<i>Diatrypella verruciformis</i>	(Ehrh.) Nitschke, 1867	-	Fagus sylvatica	Diatrype en forme de verrue
<i>Ditiola pezizaeformis</i>	(Lév.) D.A. Reid	-	Abies alba	Ditiole en forme de pezize
<i>Entoloma clypeatum</i>	(L.) Kumm.	-	Prunus spinosa	Entolome en bouclier
<i>Exidia nigricans</i>	P. Roberts (2009)	-	.	Exidie glanduleuse
<i>Exidia pitya</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	-	.	Exidie des conifères
<i>Exidia thuretiana</i>	(Lév.) Fr.	-	.	Exidie blanche
<i>Exidiopsis effusa</i>	(Brefeld ex Sacc.) A. Möll	-	.	
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	.	Amadouvier des conifères
<i>Fuligo septica</i>	(L.) F.H.Wigg., 1780	-	.	Fleur de tan
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	.	Galère marginée
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	-	.	Ganoderme aplani
<i>Gymnopilus penetrans</i>	(Fr. : Fr.) Murrill	-	.	Flammule pénétrante
<i>Heterobasidion abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 199	-	Abies alba	Hétérobaside du sapin
<i>Hydropus subalpinus</i>	(Höhn.) Singer	-	Fagus sylvatica	Mycène subalpine
<i>Hygrocybe psittacina</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	-	.	Hygrophore perroquet
<i>Hymenochaete cruenta</i>	(Pers. : Fr.) Donk	-	Abies alba	Hymenochaète de Mougeot
<i>Hyphoderma radula</i>	(Fr. : Fr.) Donk	-	.	
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Hypocrea pulvinata</i>	Fuckel, 1870	-	Fomitopsis pinicola	Hypocrée en coussin
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	-	Fagus sylvatica	Hypoxylon en forme de fraise
<i>Irpex fimbriatus</i>	(Pers. : Fr.) Kotiranta &	-	.	Steccherine fimbriée

Liste des taxons répertoriés le : 29/05/2023

Sur le site: **CHIROULET**

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Irpex nitidus</i>	(Pers. : Fr.) Saarenoksa	-	.	Polypore lustré
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Lenzite du bouleau
<i>Lycogala epidendrum</i>	(L.) Fr., 1829	-	.	Lait de loup
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	Fagus sylvatica	Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	-	.	Faux mousseron
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Po	-	.	Collybie à larges lames
<i>Melanoleuca evenosa</i>	(Sacc.) Konrad & Maubl.	-	.	Mélanoleuca blanchâtre
<i>Meruliopsis corium</i>	(Pers. : Fr.) Ginns	-	.	Mérule papyracée
<i>Mycena acicula</i>	(Schaeff.) Kumm.	-	Fagus sylvatica	Mycène très fine
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	Mycène en casque
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quéél.	-	.	Mycène livide
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	-	.	Mycène pure
<i>Mycena pura f. alba</i>	(Gillet) Kühner, 1938	-	.	Mycène pure forme blanche
<i>Mycena renatii</i>	Quéél.	-	Fagus sylvatica	Mycène à pied jaune
<i>Mycena stipata</i>	Maas Geesteranus & Sch	-	.	Mycène en touffe
<i>Mycena vitilis</i>	(Fr.) Quéél., 1872	-	.	Mycène à pied raide
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	-	.	Mucidule visqueuse
<i>Panaeolus campanulatus</i>	(Linnaeus) Quélet (1872)	-	.	
<i>Panaeolus sphinctrinus</i>	(Fr.) Quéél., 1872	-	.	Panéole à marge dentée
<i>Panus lecomtei</i>	(Fr.) Corner, 1981	-	.	
<i>Peniophora cinerea</i>	(Pers. : Fr.) Cooke, 1879	-	Fagus sylvatica	Peniophore cendrée
<i>Peniophora piceae</i>	(Pers.) J. Erikss.	-	Abies alba	Peniophore du sapin
<i>Peziza arvernensis</i>	Boud.	Val	.	
<i>Peziza varia</i>	(Hedw. ex Fr.) Fr.	Val	.	Pezize variable
<i>Pholiotina aporos</i>	(Kits van Waveren) Cléme	-	.	
<i>Pleurotus ostreatus</i>	(Jacq.) Kumm., 1871	-	.	Pleurote en huître
<i>Plicaturopsis crispa</i>	(Pers. : Fr.) D.A. Reid	-	.	Plicature du hêtre
<i>Polyporus brumalis</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	Fagus sylvatica	Polypore d'hiver
<i>Polyporus ciliatus</i>	Fr. : Fr.	-	Fagus sylvatica	Polypore cilié
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	-	.	Bolet porphyre
<i>Psathyrella candolleana</i>	(Fr.) Maire, 1937	-	.	Psathyrelle de De Candolle
<i>Psathyrella marcescibilis</i>	(Britzelm.) Singer	Val	.	
<i>Psilocybe semilanceata</i>	(Fr.) Kumm.	-	.	Psilocybe lancéolé
<i>Rugosomyces carneus</i>	(Bull. : Fr.) Bon	-	.	Calocybe couleur de chair
<i>Russula risigallina</i>	(Batsch) Sacc., 1915	-	.	Russule caméléon
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	Fagus sylvatica	Stérée hirsute
<i>Stropharia semiglobata</i>	(Batsch : Fr.) Quéél., 1872	-	.	Strophaire demi sphérique
<i>Tarzetta cupularis</i>	(L. : Fr.) Lambotte, ss De	Val	.	
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	-	Fagus sylvatica	Tramète hirsute
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Tremella mesenterica</i>	Retz. : Fr., 1769	-	.	Trémelle mésentérique
<i>Tremella simplex</i>	H.S. Jackson & G.W. Mar	-	.	.
<i>Trichaptum abietinum</i>	(Dicks. : Fr.) Ryvarden	-	Abies alba	Coriole du sapin
<i>Tricholoma terreum</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome terreux; Petit gris
<i>Tubaria autochtona</i>	(Berk. & Broome) Sacc.	-	Crataegus oxycantha	
<i>Vascellum pratense</i>	(Pers. : Pers.) Kreisel	-	.	Vesse de loup à diaphragme
<i>Xerocomus pruinatus</i>	(Fr.) Quéél.	-	.	Bolet pruineux
<i>Xylaria carpophila</i>	(Pers.) Fr., 1849	-	faîne de hêtre	Xylaire des fruits

Liste des taxons répertoriés le : 29/05/2023

Sur le site: CHIROULET

Taxons		Hôte	Nom français
<i>Xylaria filiformis</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Fr	-	Xylaire filiforme

Nombre de participants : 21

Nombre de taxons répertoriés : 93