

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 08/10/2023

Sur le site: PAYOLLE

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Agaricus silvicola</i>	(Vittad.) Peck, 1870	-	.	Agaric anisé des bois
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Genevier	-	.	Agaric jaunissant
<i>Amanita excelsa var. spissa</i>	(Fr.) Neville & Poumarat,	-	.	Amanite épaisse
<i>Amanita junquillea</i>	Quél., 1877	-	.	Amanite jonquille
<i>Amanita muscaria</i>	(L. : Fr.) Lamarck	-	.	Amanite tue-mouche, fausse oron
<i>Amanita muscaria f. flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Pouma	-	.	Amanite tue-mouche à voile jaunâ
<i>Amanita muscaria var. aureola</i>	(Kalchbr.) Quél.	-	.	Amanite tue-mouche dorée
<i>Amanita pantherina</i>	(DC. : Fr.) Krombh.	-	.	Amanite panthère
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Amanita umbrinolutea</i>	(Secrétan ex Gillet) Batail	Cf	.	Amanite à cerne sombre
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. : Fr.) Redhead, Lut	-	.	Clitocybe à pied en massue
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Bolet à beau pied
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	-	.	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Pied rouge
<i>Bondarzewia mesenterica</i>	(Schaeff.) Kreisel	Cf	.	Polypore des montagnes
<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr. : Fr.	-	.	Girole, chanterelle
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	-	.	Pezize turquoise
<i>Chlorophyllum rhacodes</i>	(Vittad.) Vellinga	-	.	Lépiote déguenillée
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	.	Meunier
<i>Craterellus tubaeformis</i>	(Bull. : Fr.) Quél.	-	.	Chanterelle en tube
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.	-	.	Dacrymycète déliquescent
<i>Fomitopsis pinicola</i>	(Swartz : Fr.) P.Karst.	-	.	Amadouvier des conifères
<i>Ganoderma carnosum</i>	Pat.	-	.	Ganoderme luisant charnu
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	-	.	Ganoderme aplani
<i>Hericium coralloides</i>	(Scop. : Fr.) Pers.	-	.	
<i>Hydnum repandum</i>	L. : Fr.	-	.	Pied de mouton
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Hypholoma lateritium</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	-	.	Hypholome couleur de brique
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	-	.	Hypoxylon en forme de fraise
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	(Wahlenb. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore à odeur de benjoin
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire muqueux
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	.	Lactaire saumoné
<i>Lactarius scrobiculatus</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	-	.	Lactaire à fossettes
<i>Lactarius vellereus</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire velouté
<i>Lenzites betulinus</i>	(L. : Fr.) Fr.	-	.	Lenzite du bouleau
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	-	.	Vesse de loup perlée
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Pers. : Pers.	-	.	Vesse de loup brun d'ombre
<i>Macrolepiota konradii</i>	(Huijsman ex P.D. Orton)	-	.	Lépiote de Konrad
<i>Macrolepiota procera</i>	(Scop. : Fr.) Singer	-	.	Coulemelle, Lépiote élevée
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	-	.	Marasme à odeur d'ail
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Po	-	.	Collybie à larges lames
<i>Meripilus giganteus</i>	(Pers. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore géant
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	-	.	Mycène pure

# Liste des taxons répertoriés le : 08/10/2023

Sur le site: PAYOLLE

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schr. : Fr.) Höhn.	-	.	Mucidule visqueuse
<i>Panus conchatus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	.	Lentin coquillage
<i>Polyporus durus</i>	(Timm) Kreisel	-	.	Polypore bai
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	(Fr.) E.-J. Gilbert	-	.	Bolet porphyre
<i>Russula chloroides var. parvispora</i>	Romagn. ex Romagn.	-	.	
<i>Russula mustelina</i>	Fr., 1838	-	.	Russule belette
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	-	.	Russule noircissante
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	-	.	Russule olivacée
<i>Scleroderma citrinum</i>	Pers. : Pers., 1801	-	.	Scléroderme vulgaire
<i>Sparassis spathulata</i>	(Schwein. : Fr.) Fr.	-	.	Sparassis des sapins
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	-	.	Stérée hirsute
<i>Tricholoma saponaceum</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome à odeur de savon
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome rutilant
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	-	.	Bolet à chair jaune
<i>Xerula melanotricha</i>	Dörfelt, 1979	-	.	Collybie à poils noirs
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	.	Collybie radicante
<i>Xerula radicata f. marginata</i>	(Konrad & Maubl.) R.H.	-	.	Collybie radicante à arêtes brun n

Nombre de participants : 27

Nombre de taxons répertoriés : 61