

# Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 14/09/2024

Sur le site: Gèdre ("Le cabanet")

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Agrocybe erebia</i>	(Fr. : Fr.) Kühner	-	.	Agrocybe brunâtre
<i>Agrocybe firma</i>	(Peck) Singer, 1940	-	.	Agrocybe velouté
<i>Bertia moriformis</i>	(Tode) De Not., 1844	-	.	Bertia en forme de mures
<i>Boletus luridus</i>	Schaeff. : Fr.	-	.	Bolet blafard
<i>Botryobasidium subcoronatum</i>	(Höhn. & Litschauer) Don	Val	.	
<i>Clitocybe obsoleta</i>	(Batsch : Fr.) Quél.	-	.	Clitocybe anisé rosâtre
<i>Clitocybe odora</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe odorant, anisé
<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuyper, 1981	-	.	Clitocybe à odeur de poulailler
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie en touffes
<i>Collybia cookei</i>	(Bres.) J.D. Arnold	-	.	Collybie à sclérote jaune
<i>Collybia peronata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	.	Marasme poivré
<i>Cortinarius betulinus</i>	Favre	-	.	
<i>Cortinarius georgianae</i>	P. Moënne-Loccoz	-	.	Cortinaire à pied de feu
<i>Cortinarius infractus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire à marge brisée
<i>Cortinarius olivaceofuscus</i>	Kühner, 1955	-	.	
<i>Cortinarius olivellus</i>	Henry, sensu Henry, non s	-	.	
<i>Cortinarius ophiopus</i>	Peck, 1878	-	.	
<i>Cortinarius subfulgens</i>	P.D. Orton, 1960	-	.	
<i>Cortinarius subolivaceus</i>	Bidaud, P. Moënne-Loccoz	-	.	
<i>Cortinarius venetus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire verdâtre
<i>Cortinarius vitellinopes</i>	(Secrétan) ex Gillet	-	.	Cortinaire puant
<i>Crepidotus cesatii</i>	(Rabenh.) Sacc.	-	.	Crépidote à spores sphériques
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew &	-	.	Tramète rougissante
<i>Entoloma versatile</i>	(Fr. ? Gillet) Moser	-	.	
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	.	Galère marginée
<i>Humaria hemisphaerica</i>	(Weber : Fr.) Fuckel	-	.	Lachnée hémisphérique
<i>Hydropus subalpinus</i>	(Höhn.) Singer	-	.	Mycène subalpine
<i>Hygrocybe cinereifolia</i>	Courtec. & Priou, 1992	Cf	.	Hygrophore à lames cendrées
<i>Hygrocybe insipida</i>	(J.E. Lange ex Lundell) M	-	.	Hygrophore insipide
<i>Hygrophorus fagi</i>	Becker & Bon	-	.	Hygrophore du hêtre
<i>Inocybe fastigiata</i>	(Schaeff. : Fr.) Quél.	Cf	.	Inocybe fastigié
<i>Inocybe geophylla var. lilacina</i>	(Peck) Gillet, 1876	-	.	Inocybe terreux lilacin
<i>Lactarius aquizonatus</i>	Kytövuori	-	.	
<i>Lactarius favrei</i>	Jahn	-	.	Lactaire à marge laineuse
<i>Lactarius flavidus</i>	Boudier, non ss Lange	-	.	
<i>Lactarius pyrogalus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	.	Lactaire à lait brûlant
<i>Lactarius torminosus</i>	(Schaeff. : Fr.) Pers.	-	.	Lactaire à toison, Lactaire à coliq
<i>Leccinum brunneogriseolum</i>	Lannoy & Estades	-	.	
<i>Leccinum carpini</i>	(R. Schulz) Moser ex D.A.	-	.	Bolet des charmes
<i>Leccinum scabrum</i>	(Bull. : Fr.) Gray	-	.	Bolet rude
<i>Lepiota cristata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	.	Lépiote crêtée
<i>Lepiota ochraceofulva</i>	P.D. Orton, 1960	-	.	

# Liste des taxons répertoriés le : 14/09/2024

## Sur le site: Gèdre ("Le cabanet")

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Lepista nuda</i>	(Bull. : Fr.) Cooke	-	.	Pied bleu
<i>Lycoperdon echinatum</i>	Pers. : Pers.	-	.	Vesse de loup hérisson
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	-	.	Coulemelle sombre
<i>Marasmius cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Cooke & Qué	-	.	Marasme à pied corné
<i>Marasmius wynneae</i>	Berk. & Broome	-	.	Marasme globuleux
<i>Megacollybia platyphylla</i>	(Pers. : Fr.) Kotlaba & Po	-	.	Collybie à larges lames
<i>Melanoleuca grammopodia</i>	(Bull. : Fr.) Pat.	-	.	Melanoleuca à pied strié
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	Mycène en casque
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	-	.	Mycène pure
<i>Mycena renatii</i>	Quél.	-	.	Mycène à pied jaune
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	-	.	Mycène rose
<i>Otidea onotica</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel	-	.	Oreille de lièvre
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	-	.	Polypore du bouleau
<i>Pluteus luctuosus</i>	Boudier, sensu Kühner	-	.	
<i>Psathyrella pseudogracilis</i>	(Romagn.) Moser ex Nath	-	.	
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	-	.	Russule verdâtre
<i>Russula cutefracta</i>	Cooke, 1881	-	.	Russule craquelée
<i>Russula grisea</i>	(Pers.?) Fr.	-	.	Russule gorge de pigeon
<i>Russula olivascens</i>	(Pers. ?) Fr.	-	.	Russule de Von Post
<i>Simocybe centunculus</i>	(Fr. : Fr.) P.Karst.	-	.	Simocybe olivâtre
<i>Tricholoma fulvum</i>	(Retz. : Fr.) Costantin &	-	.	Tricholome fauve
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome soufré
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	-	.	Collybie radicante
<i>Xylaria polymorpha</i>	(Pers.) Grev., 1824	-	.	Xylaire polymorphe

Nombre de participants : 10

Nombre de taxons répertoriés : 66