

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 14/09/2024

Sur le site: Gèdre (RTM Gavarnie)

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Agaricus silvaticus</i>	Schaeff., 1774	-	.	Agaric des forêts
<i>Agaricus silvicola</i>	(Vittad.) Peck, 1870	-	.	Agaric anisé des bois
<i>Agaricus urinascens</i>	(J. Schäffer & F.H. Mølle	-	.	Agaric à grandes spores
<i>Amanita betulae</i>	Neville & Poumarat, 2009	-	.	
<i>Amanita phalloides</i>	(Fr. : Fr.) Link	-	.	Amanite phalloïde
<i>Bisporella citrina</i>	(Batsch : Fr.) Korf & S.E.	-	.	Bisporelle citrine
<i>Boletus luridus</i>	Schaeff. : Fr.	-	.	Bolet blafard
<i>Botryohypochnus isabellinus</i>	(Fr.) Donk	Val	.	
<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr. : Fr.	-	.	Girole, chanterelle
<i>Cantharellus friesii</i>	Quél., 1872	-	.	Chanterelle abricot
<i>Chalciporus amarellus</i>	(Quélet) Bataille, sensu Q	-	.	
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	(Nyl.) Kanouse ex C.S.Ra	-	.	Pezize turquoise
<i>Chroogomphus rutilus</i>	(Schaeff. : Fr.) O.K.Mill.,	-	.	Gomphide rutilant, g. visidule
<i>Clavariadelphus pistillaris</i>	(L. : Fr.) Donk	-	.	Clavaire en pilon
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	-	.	Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe costata</i>	Kühner & Romagn. ex Kü	-	.	Clitocybe côtelé
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe en entonnoir
<i>Clitocybe obsoleta</i>	(Batsch : Fr.) Quél.	-	.	Clitocybe anisé rosâtre
<i>Clitocybe odora</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe odorant, anisé
<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuyper, 1981	-	.	Clitocybe à odeur de poulailler
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	.	Meunier
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie en touffes
<i>Collybia maculata</i>	(Alb. & Schwein. : Fr.) Ku	-	.	Collybie tachetée
<i>Collybia peronata</i>	(Bolt. : Fr.) Kumm.	-	.	Marasme poivré
<i>Collybia prolixa var. distorta</i>	(Fr.) P. Roux	-	.	Collybie tordue
<i>Coniophora puteana</i>	(Schumach. : Fr.) P.Karst	-	.	coniophore bosselé
<i>Coprinellus impatiens</i>	(Fr. : Fr.) J.E.Lange, 193	-	.	
<i>Coprinus xanthothrix</i>	Romagn., 1941	-	.	Coprin à flocons jaunes
<i>Cortinarius cotoneus</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire cotonneux
<i>Cortinarius infractus</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire à marge brisée
<i>Cortinarius raphanoides</i>	(Pers. : Fr.) Fr., sensu Mo	-	.	
<i>Crepidotus applanatus</i>	(Pers.) Kumm.	-	.	Crépidote aplani
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew &	-	.	Tramète rougissante
<i>Dichomitus campestris</i>	(Quél.) Domanski & Orlic	-	.	
<i>Entoloma aranaeosum</i>	(Quél.) Moser	-	.	Entolome arachnéen
<i>Entoloma rhodopolium f. nidorosum</i>	(Fr.) Noordeloos	-	.	Entolome à odeur de nitre
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	.	Galère marginée
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	-	.	Ganoderme aplani
<i>Geastrum quadrifidum</i>	Pers. : Pers.	-	.	Géastre à quatre branches
<i>Geastrum saccatum</i>	Fr., 1829	-	.	Géastre en forme de sac
<i>Geastrum sessile</i>	(Sowerby) Pouzar, 1971	-	.	Géastre frangé
<i>Geastrum triplex</i>	Junghuhn	-	.	Géastre à trois peaux

Liste des taxons répertoriés le : 14/09/2024

Sur le site: Gèdre (RTM Gavarnie)

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Gloeoporus dichrous</i>	(Fr. : Fr.) Bres.	-	.	
<i>Gomphidius glutinosus</i>	(Schaeff. : Fr.) Fr.	-	.	Gomphide glutineux, mufle de va
<i>Gomphidius maculatus</i>	(Scop. : Fr.) Fr.	-	.	Gomphide taché
<i>Hemimycena cucullata</i>	(Pers. : Fr.) Singer	-	.	Mycène blanc de gypse
<i>Hygrocybe cinereifolia</i>	Courtec. & Priou, 1992	-	.	Hygrophore à lames cendrées
<i>Hygrophorus arbustivus</i>	(Fr.) Fr., ss Konrad et Ma	-	.	
<i>Hygrophorus chrysodon</i>	(Batsch : Fr.) Fr.	-	.	Hygrophore à dents jaunes
<i>Hygrophorus discoxanthus</i>	(Fr.) Rea, 1908	-	.	Hygrophore à centre jaune
<i>Hymenochaete tabacina</i>	(Sowerby : Fr.) Lév.	-	.	Hyménochaète couleur de tabac
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i>	(T.Kowalski) Baral, Quel	-	.	
<i>Hypholoma epixanthum var. radicosum</i>	(J.E. Lange) Bon & Roux	-	.	Hypholome radicant
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Hypoxylon fuscum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	
<i>Hypoxylon rubiginosum</i>	(Pers.) Fr., 1849	-	.	
<i>Hypoxylon vogesiacum</i>	(Pers.) Sacc.	-	.	
<i>Inocybe geophylla var. lilacina</i>	(Peck) Gillet, 1876	-	.	Inocybe terreux lilacin
<i>Inocybe leucoblema</i>	Kühner ex Kühner	-	.	
<i>Inocybe margaritispora</i>	(Berk.) Sacc., 1887	-	.	
<i>Inocybe terrigena</i>	(Fr.) Kühner ex Kuyper	-	.	
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	-	.	Laccaire à lames pâles
<i>Lactarius aquizonatus</i>	Kytövuori	-	.	
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire muqueux
<i>Lactarius deterrimus</i>	Gröger, 1968	-	.	Lactaire de l'épicéa
<i>Lactarius favrei</i>	Jahn	-	.	Lactaire à marge laineuse
<i>Lactarius flavidus</i>	Boudier, non ss Lange	-	.	
<i>Lactarius pyrogalus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	.	Lactaire à lait brûlant
<i>Lactarius sanguifluus</i>	(Paulet) Fr., 1838	-	.	Lactaire sanguin
<i>Lactarius torminosus</i>	(Schaeff. : Fr.) Pers.	-	.	Lactaire à toison, Lactaire à coliq
<i>Leccinum carpini</i>	(R. Schulz) Moser ex D.A.	-	.	Bolet des charmes
<i>Leccinum scabrum</i>	(Bull. : Fr.) Gray	-	.	Bolet rude
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Bousset & Jossierand ex B	-	.	Lépiote à base rouge
<i>Lepiota ochraceosulfurescens</i>	(Locquin) ex Bon	-	.	Lépiote ocre jaune
<i>Lepiota oreadiformis</i>	Velen.	-	.	Lépiote graminicole
<i>Lepiota ventriosospora</i>	D.A. Reid, 1958	-	.	Lépiote à spores ventruées
<i>Lyophyllum infumatum</i>	(Bres.) Kühner	-	.	Lyophylle enfumé
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	-	.	Coulemelle sombre
<i>Macrolepiota rickenii</i>	(Velen.) Bellù & Lanzoni	-	.	Lépiote gracile
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	-	.	Faux mousseron
<i>Marasmius torquescens</i>	Quélet, sensu Orton, Joss	-	.	
<i>Marasmius wynneae</i>	Berk. & Broome	-	.	Marasme globuleux
<i>Melanoleuca grammopodia</i>	(Bull. : Fr.) Pat.	-	.	Melanoleuca à pied strié
<i>Melzericium udicola</i>	(Bourdot) Hauerlev	-	.	
<i>Mutinus caninus</i>	(Huds. : Pers.) Fr.	-	.	Satyre du chien
<i>Mycena diosma</i>	Krieglst. & Schwöbel	-	.	Mycène à deux odeurs
<i>Mycena galericulata</i>	(Scop. : Fr.) Gray	-	.	Mycène en casque
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	-	.	Mycène livide

Liste des taxons répertoriés le : 14/09/2024

Sur le site: Gèdre (RTM Gavarnie)

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Mycena polygramma</i>	(Bull. : Fr.) Gray	- .		Mycène à pied strié
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	- .		Mycène pure
<i>Mycena renatii</i>	Quél.	- .		Mycène à pied jaune
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	- .		Mycène rose
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	- .		Mucidule visqueuse
<i>Phlebia tremellosa</i>	(Schrad. : Fr.) K.K. Naka	- .		Mérule tremblante
<i>Phlebia uda</i>	(Fr. : Fr.) K.K. Nakasone	- .		
<i>Piptoporus betulinus</i>	(Bull. : Fr.) P.Karst.	- .		Polypore du bouleau
<i>Pluteus leoninus</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm.,	- .		Plutée couleur de lion
<i>Pluteus thomsonii</i>	(Berk. & Broome) Dennis	- .		Plutée cendré
<i>Polyporus durus</i>	(Timm) Kreisel	- .		Polypore bai
<i>Postia caesia</i>	(Schrad. : Fr.) P.Karst.	- .		Polypore bleuté
<i>Postia subcaesia</i>	(A. David) Jülich, 1982	- .		Polypore bleuté
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982	- .		Polypore blanc cendré
<i>Ramaria botrytis</i>	(Pers. : Fr.) Ricken	- .		Clavaire chou-fleur
<i>Ramaria sanguinea</i>	(Pers.) Quél., 1888	- .		Ramaire sanguine
<i>Rugosomyces ionides</i>	(Bull. : Fr.) Bon	- .		Calocybe violet
<i>Russula acrifolia</i>	Romagn. ex Romagn.	- .		Russule à lames âcres
<i>Russula aeruginea</i>	Lindblad	- .		Russule vert de gris
<i>Russula atropurpurea</i>	(Krombh.) Britzelm.	- .		
<i>Russula aurea</i>	Pers., 1796	- .		Russule dorée
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	- .		Russule verdâtre
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	- .		Russule charbonnière
<i>Russula exalbicans</i>	(Pers.) Melzer & Zvara	- .		Russule blanchissante
<i>Russula gracillima</i>	J. Schäffer	- .		Russule très gracile
<i>Russula sanguinaria</i>	(Bull. => Schumach.) Rau	- .		Russule sanguine
<i>Russula sardonica</i>	Fr., 1838	- .		Russule sardeine
<i>Russula violeipes f. citrina</i>	(Quél.) Romagn.	- .		Russule à pied violet forme jaune
<i>Spathularia flavida</i>	Pers. : Fr.	- .		Spatulaire jaune
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	- .		Stérée hirsute
<i>Suillus granulatus</i>	(L. : Fr.) Roussel	- .		Bolet granulé
<i>Suillus grevillei</i>	(Klotzsch : Fr.) Singer	- .		Bolet élégant
<i>Suillus viscidus</i>	(L.) Roussel, 1796	- .		
<i>Tapinella atrotomentosa</i>	(Batsch : Fr.) Šutara	- .		Paxille à pied noir
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	- .		Tramète versicolore
<i>Trichaptum abietinum</i>	(Dicks. : Fr.) Ryvarden	- .		Coriole du sapin
<i>Tricholoma atosquamosum</i>	(Chevall. ?) Sacc.	- .		Tricholome squameux
<i>Tricholoma fulvum</i>	(Retz. : Fr.) Costantin &	- .		Tricholome fauve
<i>Tricholoma stiparophyllum</i>	(Lund) P.Karst.	- .		Tricholome des bouleaux
<i>Tricholoma triste</i>	(Scopoli) Quélet, non sens	- .		
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	- .		Tricholome rutilant
<i>Xerula radicata</i>	(Rehl. : Fr.) Dörfelt	- .		Collybie radicante
<i>Xerula radicata f. marginata</i>	(Konrad & Maubl.) R.H.	- .		Collybie radicante à arêtes brun n
<i>Xylaria hypoxylon</i>	(L. : Fr.) Grev.	- .		Xylaire du bois

Liste des taxons répertoriés le : 14/09/2024

Sur le site: Gèdre (RTM Gavarnie)

Taxons	Hôte	Nom français
--------	------	--------------

Nombre de participants : 10

Nombre de taxons répertoriés : 132