

Association Mycologique de Bigorre

Liste des taxons répertoriés le : 15/09/2024

Sur le site: BAREGE (Plateau du Lienz)

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Agaricus campestris</i>	L. : Fr., 1753	-	.	Agaric champêtre, Rosé des prés
<i>Agaricus silvicola</i>	(Vittad.) Peck, 1870	Cf	.	Agaric anisé des bois
<i>Amanita muscaria f. flavivolvata</i>	(Singer) Neville & Pouma	-	.	Amanite tue-mouche à voile jaunâ
<i>Amanita pantherina f. abietum</i>	(E.-J. Gilbert) Neville & P	-	.	Amanite panthère du sapin
<i>Amanita rubescens</i>	(Pers. : Fr.) Pers.	-	.	Golmotte, amanite vineuse
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i>	(Pers. : Fr.) Redhead, Lut	-	.	Clitocybe à pied en massue
<i>Annulohyphoxylon cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Y.M.Ju, J.D.R	-	.	
<i>Boletus calopus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Bolet à beau pied
<i>Boletus edulis</i>	Bull. : Fr., 1782	-	.	Cèpe ,Cèpe de Bordeaux
<i>Boletus erythropus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Pied rouge
<i>Calocera viscosa</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Calocère visqueuse
<i>Calvatia excipuliformis</i>	(Scop. : Pers.) Perdeck	-	.	Calvatie en coupe
<i>Calvatia utriformis</i>	(Bull. : Pers.) Jaap	-	.	Calvatie en outre
<i>Cantharellus amethysteus</i>	(Quél.) Sacc., 1887	-	.	Girolle améthyste
<i>Cantharellus cibarius</i>	Fr. : Fr.	-	.	Girolle, chanterelle
<i>Chalciporus piperatus</i>	(Bull. : Fr.) Bataille	-	.	Bolet poivré
<i>Clavulina coralloides</i>	(L. : Fr.) J.Schröt., 1889	-	.	Clavaire à crêtes
<i>Clitocybe gibba</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe en entonnoir
<i>Clitocybe odora</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe odorant, anisé
<i>Clitocybe phaeophthalma</i>	(Pers.) Kuyper, 1981	-	.	Clitocybe à odeur de poulailler
<i>Clitocybe rivulosa</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Clitocybe blanchi
<i>Clitopilus prunulus</i>	(Scop. : Fr.) Kumm.	-	.	Meunier
<i>Collybia butyracea</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie beurrée
<i>Collybia confluens</i>	(Pers. : Fr.) Kumm.	-	.	Collybie en touffes
<i>Coltricia perennis</i>	(L. : Fr.) Gray	-	.	Coltricie
<i>Coniophora puteana</i>	(Schumach. : Fr.) P.Karst	-	.	coniophore bosselé
<i>Coprinus comatus</i>	(O.F. Müller : Fr.)	-	.	Coprin chevelu
<i>Coprinus micaceus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	-	.	Coprin micacé
<i>Coprinus xanthothrix</i>	Romagn., 1941	Cf	.	Coprin à flocons jaunes
<i>Cortinarius camphoratus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire à corne brûlée
<i>Cortinarius cinnabarinus</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire rouge cinabre
<i>Cortinarius cinnamomeus</i>	(L. : Fr.) Gray	-	.	Cortinaire à lames cannelle
<i>Cortinarius hinnuleus</i>	(Sowerby) Fr.	Cf	.	Cortinaire à couleur de faon
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Fr., 1838	-	.	Cortinaire purpurescent
<i>Cortinarius torvus</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	-	.	Cortinaire farouche ou à pied cou
<i>Cortinarius varius</i>	(Schaeff. : Fr.) Fr.	Cf	.	Cortinaire varié
<i>Craterellus cornucopioides</i>	(L. : Fr.) Pers.	-	.	Trompette des morts
<i>Crucibulum laeve</i>	(Huds.) Kambly, 1936	-	.	Crucibule lisse
<i>Cystoderma amianthinum</i>	(Scop.) Fayod, 1889	-	.	Cystoderme amiantacé
<i>Cystoderma granulosum</i>	(Batsch : Fr.) Fayod	-	.	Cystoderme granuleux
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Nees : Fr.	-	.	Dacrymycète déliquescant
<i>Daedaleopsis tricolor</i>	(Bull. : Fr.) Bondarzew &	-	.	Tramète rougissante

Liste des taxons répertoriés le : 15/09/2024

Sur le site: BAREGE (Plateau du Lienz)

Taxons		Hôte		Nom français
<i>Datronia mollis</i>	(Sommerf. : Fr.) Donk	-	.	Datronie molle
<i>Diatrype decorticata</i>	(Pers. : Fr.) Rappaz	-	.	
<i>Diatrype disciformis</i>	(Hoffm. ex Fr.) Fr.	-	.	Diatrype en forme de pièce
<i>Entoloma corvinum</i>	(Kühner) Noordeloos	Cf	.	
<i>Entoloma incanum</i>	(Fr. : Fr.) Hesler	-	.	Entolome à pied vert
<i>Entoloma rhodopolium f. nidorosum</i>	(Fr.) Noordeloos	-	.	Entolome à odeur de nitre
<i>Galerina marginata</i>	(Batsch) Kühner, 1935	-	.	Galère marginée
<i>Ganoderma lipsiense</i>	(Batsch) G.F.Atk., 1908	-	.	Ganoderme aplani
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	(Wulfen : Fr.) P.Karst.	-	.	Lenzite des clôtures
<i>Gomphidius glutinosus</i>	(Schaeff. : Fr.) Fr.	-	.	Gomphide glutineux, mufle de va
<i>Hebeloma sinapizans</i>	(Paulet ex Fr.) Gillet	-	.	Hébélome échaudé
<i>Helminthosphaeria clavariarum</i>	(L.R.Tulasne) Fuckel	-	.	Parasite de clavaire
<i>Heterobasidion abietinum</i>	Niemelä & Korhonen, 199	-	.	Hétérobaside du sapin
<i>Humaria hemisphaerica</i>	(Weber : Fr.) Fuckel	-	.	Lachnée hémisphérique
<i>Hydnum rufescens</i>	Pers. : Fr.	Cf	.	Pied de mouton roux
<i>Hydnum slovenicum</i>	Liimat. & Niskanen, 2018	-	.	
<i>Hygrocybe conica</i>	(Schaeff. : Fr.) P.Kumm.,	Cf	.	Hygrophore conique
<i>Hygrocybe konradii</i>	R. Haller Aar., 1955	Cf	.	
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	(Wulfen : Fr.) Maire	-	.	Fausse girofle
<i>Hypholoma epixanthum var. radicosum</i>	(J.E. Lange) Bon & Roux	-	.	Hypholome radicant
<i>Hypholoma fasciculare</i>	(Huds. : Fr.) P.Kumm., 18	-	.	Hypholome en touffe
<i>Hypholoma lateritium</i>	(Schaeff. : Fr.) Kumm.	-	.	Hypholome couleur de brique
<i>Hypomyces lateritius</i>	(Fr. : Fr.) Tul. & C.Tul., 1	-	.	
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	(Scopoli : Fr.) Kickx	-	.	Hypoxylon en forme de fraise
<i>Inocybe geophylla var. lilacina</i>	(Peck) Gillet, 1876	-	.	Inocybe terreux lilacin
<i>Inocybe pudica</i>	Kühner, 1947	-	.	Inocybe pudique
<i>Kuehneromyces mutabilis</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer &	-	.	Pholiotte changeante
<i>Laccaria affinis</i>	(Singer) Bon, 1983	-	.	Laccaire à lames pâles
<i>Laccaria amethystina</i>	(Huds. ? Kumm.) Cooke	-	.	Améthyste, petit violet
<i>Laccaria proxima</i>	(Boud.) Pat.	-	.	Laccaire de Moeller
<i>Lactarius blennius</i>	(Fr.) Fr., 1838	-	.	Lactaire muqueux
<i>Lactarius deterrimus</i>	Gröger, 1968	-	.	Lactaire de l'épicéa
<i>Lactarius flavidus</i>	Boudier, non ss Lange	-	.	
<i>Lactarius fluens</i>	Boud.	-	.	Lactaire coulant
<i>Lactarius pallidus</i>	Pers. : Fr.	-	.	Lactaire pâle
<i>Lactarius salmonicolor</i>	Heim & Leclair	-	.	Lactaire saumoné
<i>Lactarius semisanguifluus</i>	Heim & Leclair	-	.	Lactaire semi-sanguin
<i>Lactarius torminosus</i>	(Schaeff. : Fr.) Pers.	-	.	Lactaire à toison, Lactaire à coliq
<i>Leccinum floccopus</i>	(E.-J. Gilbert) Redeuilh, 1	-	.	Bolet orangé terne
<i>Leotia lubrica</i>	(Scop.) Pers. : Fr.	-	.	Léotie visqueuse
<i>Lepiota clypeolaria</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Lépiote en bouclier
<i>Lepiota ignivolvata</i>	Bousset & Jossierand ex B	-	.	Lépiote à base rouge
<i>Lepiota ochraceosulfurens</i>	(Locquin) ex Bon	-	.	Lépiote ocre jaune
<i>Lepiota oreadiformis</i>	Velen.	-	.	Lépiote graminicole
<i>Lepiota ventriospora</i>	D.A. Reid, 1958	-	.	Lépiote à spores ventruées
<i>Lepista caespitosa</i>	(Bres.) Singer, 1951	Val	.	Lépiste cespiteux

Liste des taxons répertoriés le : 15/09/2024

Sur le site: BAREGE (Plateau du Lienz)

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Lepista nebularis</i>	(Batsch : Fr.) Harmaja	- .		Clitocybe nébuleux
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Pers., 1796	- .		Vesse de loup perlée
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Pers. : Pers.	- .		Vesse de loup brun d'ombre
<i>Macrolepiota fuliginosa</i>	(Barla) Bon, 1977	- .		Coulemelle sombre
<i>Marasmius alliaceus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr.	- .		Marasme à odeur d'ail
<i>Marasmius cohaerens</i>	(Pers. : Fr.) Cooke & Qué	- .		Marasme à pied corné
<i>Marasmius oreades</i>	(Bolt. : Fr.) Fr.	- .		Faux mousseron
<i>Morganella pyriformis</i>	(Schaeff. : Pers.) Kreisel	- .		Vesse de loup en forme de poire
<i>Mycena acicula</i>	(Schaeff.) Kumm.	- .		Mycène très fine
<i>Mycena crocata</i>	(Schrad. : Fr.) Kumm.	- .		Mycène à lait orangé
<i>Mycena flavoalba</i>	(Fr.) Quél., 1872	- .		Mycène jaune pâle
<i>Mycena pelianthina</i>	(Fr. : Fr.) Quél.	- .		Mycène livide
<i>Mycena pura</i>	(Pers. : Fr.) Kumm., 1871	- .		Mycène pure
<i>Mycena renatii</i>	Quél.	- .		Mycène à pied jaune
<i>Mycena rosea</i>	(Bull. ? Pers.) Gramberg	- .		Mycène rose
<i>Mycena rubromarginata</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	- .		Mycène à marge rouge
<i>Ombrophila pura</i>	(Pers. : Fr.) Baral	- .		Bulgarie pure
<i>Otidea alutacea</i>	(Pers.) Masee, 1895	- .		Oreille de cuir tendre
<i>Otidea onotica</i>	(Pers. : Fr.) Fuckel	- .		Oreille de lièvre
<i>Oudemansiella mucida</i>	(Schrad. : Fr.) Höhn.	- .		Mucidule visqueuse
<i>Panaeolus antillarum</i>	(Fr. : Fr.) Morgan	- .		Paneole coprophile sans anneau
<i>Panus conchatus</i>	(Bull. : Fr.) Fr.	- .		Lentin coquillage
<i>Pluteus cervinus</i>	(Schaeff. ?) Kumm.	- .		Plutée couleur de cerf
<i>Polyporus leptcephalus</i>	(Jacq. : Fr.) Fr., 1821	- .		Polypore variable
<i>Porostereum spadiceum</i>	(Pers. : Fr.) Hjortstam &	- .		Lophaire châtaigne
<i>Postia tephroleuca</i>	(Fr. : Fr.) Jülich, 1982	- .		Polypore blanc cendré
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	(Scop. : Fr.) P.Karst., 186	- .		Hydne gélatineux
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	(Jacq. : Fr.) P.Karst.	- .		Polypore cinabre
<i>Russula albonigra</i>	(Krombh.) Fr.	- .		Russule blanche et noire
<i>Russula cavipes</i>	Britzelm.	- .		Russule à pied creux
<i>Russula chloroides</i>	(Krombh.) Bres.	- .		Russule verdâtre
<i>Russula cyanoxantha</i>	(Schaeff.) Fr.	- .		Russule charbonnière
<i>Russula fellea</i>	(Fr. : Fr.) Fr.	- .		Russule de fiel
<i>Russula illota</i>	Romagn., 1954	- .		Russule mal lavée
<i>Russula lepida</i>	Fr., 1836	- .		Russule jolie
<i>Russula mairei</i>	Singer, 1929	- .		
<i>Russula mustelina</i>	Fr., 1838	- .		Russule belette
<i>Russula nigricans</i>	(Bull. ?) Fr.	- .		Russule noircissante
<i>Russula ochroleuca</i>	Pers.	- .		Russule ocre et blanc
<i>Russula olivacea</i>	(Schaeff.) Fr.	- .		Russule olivacée
<i>Russula queletii</i>	Fr., 1872	- .		Russule de Quelet
<i>Russula sanguinaria</i>	(Bull. => Schumach.) Rau	- .		Russule sanguine
<i>Russula vesca</i>	Fr., 1836	- .		Russule comestible
<i>Schizophyllum commune</i>	Fr. : Fr., 1815	- .		Schizophylle commune
<i>Schizopora paradoxa</i>	(Schrad. : Fr.) Donk	- .		Schizopore paradoxale
<i>Stereum hirsutum</i>	(Willd. : Fr.) Pers., 1800	- .		Stérée hirsute

Liste des taxons répertoriés le : 15/09/2024

Sur le site: BAREGE (Plateau du Lienz)

Taxons			Hôte	Nom français
<i>Stereum rugosum</i>	(Pers. : Fr.) Fr.	-	.	Stérée rugueuse
<i>Strobilomyces strobilaceus</i>	(Scop. : Fr.) Berk.	-	.	Bolet pomme de pin
<i>Stropharia caerulea</i>	Kreisel, 1979	-	.	Strophaire bleu
<i>Stropharia semiglobata</i>	(Batsch : Fr.) Quél., 1872	-	.	Strophaire demi sphérique
<i>Suillus granulatus</i>	(L. : Fr.) Roussel	-	.	Bolet granulé
<i>Suillus grevillei</i>	(Klotzsch : Fr.) Singer	-	.	Bolet élégant
<i>Tapinella atrotomentosa</i>	(Batsch : Fr.) Šutara	-	.	Paxille à pied noir
<i>Trametes hirsuta</i>	(Wulfen : Fr.) Pilát, 1939	-	.	Tramète hirsute
<i>Trametes versicolor</i>	(L.) Lloyd, 1920	-	.	Tramète versicolore
<i>Tremiscus helvelloides</i>	(DC. : Fr.) Donk	-	.	Guepine rougeâtre
<i>Tricholoma columbetta</i>	(Fr. : Fr.) Kumm.	-	.	Colombette
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Bon, 1983	-	.	Tricholome qui fait cligner des ye
<i>Tricholoma sciodes</i>	(Pers.) C. Martin	-	.	Tricholome gris
<i>Tricholoma sulphureum</i>	(Bull. : Fr.) Kumm.	-	.	Tricholome soufré
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	(Schaeff. : Fr.) Singer	-	.	Tricholome rutilant
<i>Vascellum pratense</i>	(Pers. : Pers.) Kreisel	-	.	Vesse de loup à diaphragme
<i>Xerocomus chrysenteron</i>	(Bull.) Quél., 1888	-	.	Bolet à chair jaune
<i>Xerocomus pruinatus</i>	(Fr.) Quél.	-	.	Bolet pruineux
<i>Xylaria hypoxylon</i>	(L. : Fr.) Grev.	-	.	Xylaire du bois

Nombre de participants : 0

Nombre de taxons répertoriés : 153